TRAVAUX DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE «GRIGORE ANTIPA»

THE JOURNAL OF "GRIGORE ANTIPA" NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY

Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 66 (1): 17–105 (2023)
doi: 10.3897/travaux.66.e102065

RESEARCH ARTICLE

An updated checklist of chironomid species (Diptera, Chironomidae) from Romania

Victoria Tatole[1]

1 *7 Finlanda, 011776 Bucharest, Romania*

Corresponding author: *Victoria Tatole* (victoria.tatole@gmail.com)

Received 16 February 2023 | Accepted 3 May 2023 | Published 30 June 2023

Citation: Tatole V (2023) An updated checklist of chironomid species (Diptera, Chironomidae) from Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 66(1): 17–105. https://doi.org/10.3897/travaux.66.e102065

Abstract

Present checklist of Romanian chironomid species comprises 722 taxa (6 subfamilies, 13 tribes, 2 subtribes, 142 genera, 42 subgenera and 517 species), listing 179 taxa more than the last published one (Tatole 2000). It also contains chorological data for 487 Romanian chironomid, over a period of almost 150 years.

Keywords

Tanypodinae, Telmatogetoninae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae, Chironominae, chorology.

Introduction

Amid the Romanian dipterans, Family Chironomidae is the best represented one (517 species), followed by Syrphidae (465 specii) and Tachinidae (339 species) both belonging to Suborder Brachycera (Pârvu, unpublished data).

Thus far, three checklists on Romanian chironomids have been published, respective: Albu (1966), which included 125 identified and/or described adult species (♂), Cure (1985) and Tatole (2000), the first one listing 402, and the second one 403 determined/described adult (♂) and larva species. The first two lists also contain location data for the listed species .

Present checklist, published 23 years after the last one (Tatole 2000), aims to do a taxonomical and chorological update on the chironomid fauna from Romania.

Copyright *Tatole*. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Methods

Current checklist compiles both personal data, as well as an overabundance of bibliographical material regarding the taxonomy and chorology of Romanian chironomids.

The arrangement of taxa in this list uses as a standard the last version of Fauna Europaea, Family Chironomidae (Diptera: Nematocera) (Spies and Saether 2013).

The subfamilies are listed phylogenetically, and for each of them the taxa are listed alphabetically.

The developmental stage of chironomid species is mentioned using the abbreviations: **I, L** where **I** is imago (male) and **L** is larva.
The synonyms are given for 97 cited species.

Used abbreviations:

in English: A=Arm; **Br**=Brook; **Brs**=Brooks; **Ch**=Channel; **Db**=Dead branch; **DL**=Dam Lake; **I**=Islet; **L**=Lake; **Ls**=Lakes; **M**=Moor; **Mts**=Mountains; **P**=Pound; **R**=River; **Rs**=Rivers; **Sp**=Spring; **Tb**=Tributary; **V**=Valley.

in German: B=Bach; **Fl**=Fluβ; **Ft**=Fischteich; **K**=Kanal; **OE**=Oltenia Ebene; **Q**=Quelle; **S**=See; **Spf**=Sump; **StS**=Stause.

Results

Checklist

Order **Nematocera** Dumeril, 1805
Infraorder **Culicomorpha** Hennig, 1948
Superfamily **Chironomoidea** Newman, 1834
Family **Chironomidae** Newman, 1834
Subfamily **Tanypodinae** Skuse, 1889 a
Tribe **Anatopyniini** Fitkau, 1962
Genus ***Anatopynia*** Johannsen, 1905

A. plumipes (Fries, 1823) (L)
Distribution: Bistrița (Izvorul Alb) (Cure 1962, 1985); Donaudelta (S Matița, Tihai), Olteț (Sp in Polovraci-Baia de Fier area (Rogoz 1972); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005); North Dobroudja (Pojărâta Br) (Tatole 2009).

Tribe **Clinotanypodini** Coffman, 1978
Genus ***Clinotanypus*** Kieffer, 1913

C. nervosus (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Herculesbad, Orsova (Kowarz 1873); Bistrița (Bistricioara, Corbul Br) (Cure 1962); Donaudelta (S Matița, Meleaua Sacalin: Sf. Gheorghe A) (Cure 1985; Tatole 1983); S Marica, Victoria (Cure 1985); Crișul Repede (upstream Odorhei, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Padina Urşilor Br) (Tatole 2003a, 2004c); North Dobroudja (Smârdan A) (Tatole 2009).

C. pinguis (Loew, 1861) (L)
Distribution: Olt (Vișlea,Voila Rs, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); North Dobroudja (Alba R) (Tatole 2009).

Tribe **Macropelopiini** Zavřel, 1929
Genus ***Apsectrotanypus*** Fittkau, 1962

A. trifascipennis (Zetterstedt, 1838) (L)
Distribution: Jiu (B Câmpușel) (Cure 1985); Crișul Repede (upstream Odorhei) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Cald, Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999).

Genus ***Macropelopia*** Thienemann, 1916

M. adaucta Kieffer, 1916 (L)
Distribution: Retezat Mts (Caprelor, Iezilor, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

M. nebulosa (Meigen, 1804) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1968); Retezat Mts (Florica, Gemenele, Negru, Porții, Zănoaga Ls) (Albu 1972b, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Jiu (Motru) (Cure 1985); Crișul Alb (Sp area), Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (upstream Odorhei, Fughiu, Drăgan, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică Rs) (Tatole 2004c); Piatra Craiului (Vlădușca R) (Tatole 2007); Izvoru Muntelui Bicaz L (Taşca: 46°57'27"N, 26°04'39"E) (Dascălu et al. 2009).

M. notata (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999).

Genus ***Psectrotanypus*** Kieffer, 1909

P. varius (Fabricius, 1787) (I+L)
Distribution: Ialomița (Fl Vlăsia) (Cure 1985); Olt (Cârța R, Olteț–Urzica, Cornetu–Danube) (Cure 1971, Tatole 2002); Piatra Craiului (Padina Urşilor Br, Bârsa Mare

P, Râul Mare al Zărneştilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Retezat Mts (Bârlii Br) (Tatole 2004c).

Tribe **Natarsiini** Roback and Moss, 1978
Genus ***Natarsia*** Fittkau, 1962

N. nugax (Walker, 1856)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

N. punctata (Fabricius, 1805) (I+L)
Distribution: Sebeş Mts (Bistra R) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Fărcaşa, Galu, Largu, Hangu, Buhalniţa, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Secu, Izvorul Muntelui, Bicaz) (Cure 1962); Sinaia (Albu 1967a); Danube (Porţile de Fier: Mraconia) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică Rs) (Tatole 2004c); Someşul Mic (Apahida) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Tribe **Pentaneurini** Hennig, 1950
Genus ***Ablabesmyia*** Johansen, 1905

A. (Ablabesmyia) aspera (Roback, 1959) (L)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Botnariuc and Cure 1999).

A. (Ablabesmyia) longistyla Fittkau, 1962 (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Mureş (Răstolita, Tihu Rs) (Tatole 1995); Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Olt (Făgăraş–Avrig) (Tatole 2002); Piatra Craiului (Şpârla Tămaşului Br, Bârsa Mare P, Râul Mare al Zărneştilor, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007); Izvoru Muntelui Bicaz L: 46°57'36"N, 26°06'33"E) (Dascălu et al. 2009); North Dobroudja (Sulucului V, Alba R) (Tatole 2009).

A. (Ablabesmyia) monilis (L, 1758) (I+L)
Distribution: Herculesbad, Orşova (Kowarz 1873); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Lopatna Ch, Ghiolul Orechovo, Tri–Ozera, Sahaua Ledeancei, Cordon, Cuibeda) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); Izvoru Muntelui Bicaz L (Bistriţa, Taşca: 46°57'27"N, 26°04'39"E and 46°57'36"N, 26°06'33"E (Cure 1962, Dascălu et al. 1999); Danube (Nera, Elişeva, Mraconia, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963,1972a, Albu and Cure 1975), (Ch in Penciu Forest, Gostinu Ch, upstream Mostiştea, Mostiştea Ch) (Tatole 2005); S Marica, Victoria (Cure 1972c); Argeş, Bobaia (OE), Frăsinet, Poiana Braşov (Cure 1985); Vâlsan (Tatole 1993c); Dăbuleni („parcela muzeu"=museum plot) (Tatole et al. 1994); Mureş (Răstolita, Mijlocu, Ilva, Ilva Mare Rs) (Tatole 1995, 1996); Barcău R (Sârg) (Szitó 1997); Crişul Repede (Fughiu, Drăgan, Iad) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Olt (Viştea, Voila

Rs, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Padina Urşilor, Bârsa Tămaşului Brs, Râul Mare al Zărneştilor, Curmătura, Dâmbovicioara Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007).

A. (Ablabesmyia) phatta (Egger, 1863) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Tismana, Sinaia (Cure 1985); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007); North Dobroudja (Sulucului V) (Tatole 2009).

Nomen dubium in *Ablabesmyia*

A. pectinata Botnariuc and Cândea–Cure 1953 (L)
Distribution: Danube Delta (Orechovo, Lopatna Ch) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); S Marica (Cure 1985).

Genus ***Concchapelopia*** Fittkau, 1957

C. melanops (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Crişul Repede (Fughiu) (Tudorancea and Tudorancea 1998; Tudorancea 1999), Someşul Mic (Gilău, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

C. pallidula (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Jiu (Motru, Gilort, Tismana) (Cure 1985); Retezat Mts (Netiş, Râuşor, Dobrun, Zlătuia Rs) (Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997); Crişul Alb (Brad), Crişul Negru (Borz) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Şpârla Tămaşului, Padina Hotarului Brs, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

C. viator (Kieffer, 1911) (I)
Distribution: Argeş (Budeşti) (Albu 1966b); Sinaia (Cure 1985).

Genus ***Guttipelopia*** Fittkau,1962

G. guttipennis (van der Wulp, 1861) (L)
Distribution: Donau (StS Eisernes Tor) (Cure 1985).

Genus ***Hayesomyia*** Murray et Fittkau, 1986

H. senata (Walley, 1925) (L)
Distribution: Someşul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Krenopelopia*** Fittkau, 1962

K. binotata (Wiedemann, 1817) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Gemenele, Știrbu, Lia, Zănoaga Ls, Bârlii, Văgăuna Neagră, Dobrun, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Mureș (Răstolița, Gălăoaia, Gălăoaia Mare Rs) (Tatole 1995, 1996b); Crișul Alb (Ineu), Crișul Repede (Iad) (Szitó and Mózes 1997).

K. nigropunctata (Staeger, 1839) (L)
Distribution: Bistrița R–DL Bicaz (Cure, 1962).

Genus ***Labrundinia*** Fittkau, 1962

L. longipalpis (Goetghebuer, 1921) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b), Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Prahova–Tal, Jiu (Tismana R, Tismănița B), (Cure 1985); Olt (Olteț, Râbari Br, Făgăraș–Avrig) (Cure 1971, 1985, Tatole 2002); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului, Șpârla Tămașului Br) (Tatole 2003a, 2004b); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică Rs) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Smârdan A, Alba R) (Tatole 2009).

Genus ***Larsia*** Fittkau, 1962

L. curticalcar (Kieffer, 1918) (L)
Distribution: Donau (StS Eisernen Tors) (Cure 1985).

Genus ***Monopelopia*** Fittkau, 1962

M. tenuicalcar (Kieffer, 1918) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Ghiolul Orechovo, Crasnicol Ch) (Botnariuc and Cândea 1953b); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Motru, Prahova (Spf Bîlbîitoarea) (Cure 1985); Piatra Craiului (Saivane Sp) (Tatole 2003a, 2004b); North Dobroudja (Sulucului V) (Tatole 2009).

Genus ***Nilotanypus*** Kieffer, 1923

N. dubius (Meigen, 1804) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1967a); Retezat Mts (Negru, Zănoaga Ls, Râușor, Văgăuna Neagră, Dobrun, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 1994, 2004a, Cogălniceanu et al. 2009); Prahova (Teișani) (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Mare, Vlădușca Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Baiului Mts (Valea Roșie Br, Azuga, Unghia Mică, Unghia Mare Rs) (Tatole 2004c).

Genus ***Paramerina*** Fittkau, 1962

P. anomala Beck et Beck, 1966
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

P. cingulata (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Bucura, Florica, Gemenele, Negru, Răsucit, Știrbu, Zănoaga Ls, Râușor, Dobrun, Zlătuia Rs) (Albu 1972b, Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Cerna (Albu and Cure 1975); Jiu (downstream Livezeni), Topleț (Cure 1985).

Genus ***Rheopelopia*** Fittkau, 1962

R. maculipennis (Zetterstedt, 1838) (I)
Distribution: Danube (Iron Gates:Eșelnița) (Albu and Cure 1975, Cure 1985).

R. ornata (Meigen, 1838) (I)
Distribution: Chirnogi, Budești (Albu 1966a, Cure 1985).

R. perda (Roback, 1971) (L)
Distribution: Crișul Repede (Fughiu) (Tudorancea 1999); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Schineriella*** Murray et Fittkau, 1988

S. schineri (Strobl, 1880) (I)
Distribution: Chirnogi (Albu 1966a, Cure 1985).

Genus ***Telopelopia*** Roback, 1971

T. fascigera (Verneaux, 1970)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Thienemannimyia*** Fittkau, 1957

T. geijeskesi (Goetghebuer, 1934) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1968); Retezat Mts (Râușor, Bârlii, Netiș, Dobrun, Zlătuia, Râul Mare) (Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997); Someșul Mic (Gilau) (Tudorancea and Tudorancea 1999, 2000–2001); Piatra Craiului (Padina Urșilor Br, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică, Unghia Mare Rs) (Tatole 2004c).

T. laeta (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1967a); Prahova (B Babeș), Olteț (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele L) (Botnariuc and Tatole 1997).

T. lentiginosa (Fries, 1823) (L)
Distribution: Sebeș Mts (Bistra R) (Botnariuc 1956); Bistrița (Fărcașa, Galu, Largu, Hangu, Buhalnița, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Borcut, Putna, Pintec, Valea Seacă, Grințieșul Mare), Bicaz DL (Ceahlău) (Cure 1962); Danube (Vărad, Liuborajdea, Crușovița, Oravița, Mraconia, Vodița, Sp area Porțile de Fier, Coronini–Orșova, Jiu–Olt, Mostiștea Ch, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Casimcea, Sulina A, Sf. Gheorghe A, Meleaua Sacalin (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 1983, 2005); Argeș, Ialomița, Prahova, Siret (Fl Moldova, Tarcău, B Uzului, Trotuș), OE (Drincea), Ft Frăsinet (Cure 1985); Olt (Olteț: Sp in Polovraci-Baia de Fier area, Valea Cașilor, Scoreiu, Dridif, Vișstea Mare Rs, Cornetu–Danube) (Rogoz 1972, Tatole and Prunescu–Arion 1992, Tatole 1999, 2002, 2004c); Retezat Mts (Gemene L) (Botnariuc and Tatole 1997); Crișul Alb (Sp area, Brad, Aciuța, Ineu), Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (Bologa, Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Stâna de Vale, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Bârsa Mare, Vlăduşca, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); North Dobroudja (Alba R) (Tatole 2009).

T. northumbrica (Edwards, 1929)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Trissopelopia*** Kieffer, 1923

T. flavida Kieffer, 1923 (L)
Distribution: Jiu (Livezeni, Motru, Tismana) (Cure 1985); Parâng Mts (Bistra Tb) (Tatole 2004c).

T. longimanus (Staeger, 1839) (L)
Distribution: Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (Iad) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Xenopelopia*** Fittkau, 1962

X. falcigera (Kieffer, 1911) (L)
Distribution: Donaudelta (Letea, Roșuleț), OE (Fl Bălășeu), Prahova (Spf Bîlbîitoarea und Stegardin) (Cure 1985).

Genus ***Zavrelimyia*** Fittkau,1962

Z. hirtimana (Kieffer, 1918) (L)
Distribution: Donaudelta, Frăsinet, S Vitioara (Cure 1985).

Z. melanura (Meigen, 1804) (I+L)
=*Tanypus tretrastictus* Kieffer, 1918
Distribution: Danube Delta (Gârla Lopatna, Lopatna Ch, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); Sebeș Mts (Sp Gotul, Db of Sebeș, Tăul Șurianu) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistricioara, Putna), Bicaz DL (Potoci) (Cure 1962); Danube (Nera, Boșneag, Crușovița, Oravița, Liuborajdea, Elișeva, Mraconia, Vodița, Dinu, Slobozia Ch, Sulina A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Retezat Mts (Ana, Bucura, Florica, Gemenele, Lia, Negru, Porții, Răsucit, Zănoaga Ls) (Albu 1972b, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Olteț, Jiu (Tismana), Prahova, Doftana, Ialomița (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Șpârla Tămașului, Padina Urșilor Brs, Râul Mare al Zărneștilor, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

Tribe **Procladiini** Roback, 1971
Genus ***Procladius*** Skuse, 1889

P. (Holotanypus) choreus (Meigen, 1804) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Argeș, Casimcea, Ialomița, Jiu, Moldova, Ft Frăsinet, Siutghiol, Tașaul, Gargalîc, S in Colentina–Tal (Cure 1985); Izvoru Muntelui–Bicaz (Rugințești, Buhalnița, Hangu, Șes Hangu, Izvorul Alb, Secu, Baraj, Bistricioara, Ceahlău) (Cure 1985, Plăvan 2007, 2010, Plăvan et al. 2012); Alah Bair Sp and Br (Prunescu–Arion et Tatole 1986); Retezat Mts (Agățat, Ana, Bucura, Gemenele, Iezilor, Negru, Porții, Radeș II, Zănoaga Ls, Bârlii, Netiș, Râul Mare Rs) (Tatole 1994, 2004a, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Crișul Alb (Brad), Crișul Negru (Poiana, Borz, Tinca), Crișul Repede (Aleșd, upstream Odorhei, Fughiu) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (Vetiș) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Scoreiu, Breaza, Dridif, Sâmbăta Vișstea, Voila, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Parâng Mts (Gotul Sp, Oașa L, Șurianu L, Sebeș Rs) (Tatole 2004c); Danube (Slobozia P, Ch in Penciu Forest, Gostinu Ch, upstream Mostiștea) (Tatole 2005); North Dobroudja (Sulucului V, Pojârâta Br, Luncavița P, Telincea, Babadag, Taița Ls, Alba R) (Tatole 2009).

P. (Holotanypus) culiciformis (L. 1767) (I+L)
Distribution: Danube (Cerna, Iron Gates) (Albu and Cure 1975, Cure 1985).

P. (Holotanypus) ferrugineus (Kieffer, 1918) (L)
Distribution: Razelm–Sinoe (Cure 1985); Sărăturile L (Dobrogea) (Popescu–Marinescu and Năstăsescu 1987).

Nomen dubium, probably, in *Procladius*

P. (Psilotanypus) oltezii Cure 1971 (L)
Distribution: Olteț (Sârbeşti, Alunul Rs), Slătioara (Moldova R) (Cure 1971); Neajlov, Moldova (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene) (Botnariuc and Tatole 1997).

Tribe **Tanypodini** Skuse, 1889
Genus ***Tanypus*** Meigen, 1803

T. (Tanypus) kraatzi (Kieffer, 1912) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Furtuna, Puiu, Musura, Sahaua Văcarului Nuntași, Razelm–Sinoe) (Botnariuc and Cândea 1953b, Cure 1985); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Someșul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005).

T. (Tanypus) punctipennis Meigen, 1818 (I+L)
Distribution: Herculesbad, Orsova (Kowarz 1873); Danube Delta (Obretinul Mic, Obretinul Mare, Cordon) (Botnariuc and Cândea 1953b); Bicaz DL (Potoci) (Cure 1962); Danube (Coronini–Orșova, Eșelnița, Cerna, Mraconia Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina: S Potcoava, Sf. Gheorghe (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Crapina–Jijila (Albu 1966a); Chirnogi (Albu 1966a, 1967b, Albu and Botnariuc 1966); Argeș (Dîmbovnic), Prahova (Spf Bîlbîitoarea, S Vitioara), Mureș, Ft Frăsinet (Cure, 1985); Barcău (Marghita) (Szitó 1997); Crișul Alb (Brad), Crișul Negru (Borz, Tinca) (Szitó and Mózes 1997), Crișul Repede (Aleșd, Fughiu) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș upstream Cluj, downstream Beclean) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Dridif R, Cornetu–Danube) (Tatole 2002, 2004c); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); North Dobroudja (Luncavița P) (Tatole 2009).

(Tanypus) vilipennis (Kieffer, 1918) (L)
Distribution: Bicaz DL (Ceahlău) (Cure 1962); Danube (Pietriş, Gitanului, Cărăbulea Is, Crușovița) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); S Vitioara, S Comana, FT Frăsinet (Cure 1985); Olt (Avrig L, Valea Caşilor, Neagra, Vişтea Mare, Arpaşu Mare Rs) (Tatole and Prunescu–Arion 1992, Tatole 2002); Piatra Craiului (Dâmbovița R) (Tatole 2007); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009).

SUBFAMILY **TELMATOGETONINAE** Wirth, 1949
Genus ***Thalassomya*** Schiner, 1856

T. frauenfeldi Schiner, 1856 (L)
Distribution: Scwarzes Meer (Agigea) (Cure 1985).

SUBFAMILY **DIAMESINAE** Kieffer, 1922
Tribe **Boreoheptagyiini** Brundin, 1966
Genus ***Boreoheptagyia*** Brundin, 1966

B. brevitarsis (Tokunaga, 1936)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

B. legeri (Goetghebuer, 1933) (I+L)
=*Heptagyia punctulata* Goetghebuer, 1934
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Izvorul Alb) (Cure 1962); Topleț (Albu 1980); West–Jiu, Olteț (B Urlieș) (Cure 1985); Parâng Mts (Gotu Br, Bistra R) (Tatole 2004c).

B. rugosa (Saunders, 1930) (L)
Distribution: Retezat Mts (Știrbu, Zănoaga Ls, Râușor R) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009).

Tribe **Diamesini** Kieffer, 1922
Genus ***Diamesa*** Meigen,1835

D. (Diamesa) bertrami Edwards, 1935 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1967a).

D.* (*Diamesa*) *bohemani Goetghebuer, 1932 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1967a); Retezat Mts (Lia L, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a).

D. (Diamesa) cinerella Meigen, 1835 (L)
Distribution: Făgăraş Mts (Bâlea L: 45° 36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

D.* (*Diamesa*) *insignipes Kieffer, 1908 (I+L)
=*Diamesa* (*Diamesa*) *prolongata* Kieffer, 1909
Distribution: Bistrița (Largu, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Borul Br, Corbul Br, Putna, Valea Seacă) (Cure 1962); Sinaia (Albu 1967a, 1980); Danube (Plavișevița, Cerna, Bahna, Mahâru Pump Station, Păsărica, Dinu, Cama I, km 502, Acalia, Pietriş, Vâna, Cărăbulea Is, km 510, 509, Ch in Penciu Forest, Gostinu Ch, upstream Mostiștea) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Jiu (Motru, Gilort), Argeș, Ialomița, Someșul Cald, Someșul Mic, Moldova (Cure 1985); Retezat Mts (Știrbu, Gemene, Ana Ls, Bârlii, Radeş, Văgăuna Neagră, Râușor, Râul Mare Rs) (Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Mureș (Gălăoaia, Cofu, Bistra, Stegea Rs) (Tatole 1996); Olt (Făgăraș–Avrig, Lotru, Călimănești, Râmnicu Vâlcea) (Tatole 1999, 2002); Piatra Craiului (Șpârla Tămaşului Br, Vlădușca, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Prahova (Predeal, Azuga, Cîmpina, B Peleș, Izvorul Dorului Valea Cerbului) (Cure 1985, Preda et al. 2004); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică, Unghia Mare Rs) (Tatole 2004c).

D.* (*Diamesa*) *latitarsis (Goetghebuer 1921) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1967a); Retezat Mts (Ana, Lia Ls, Radeș R, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 1994); Agapia (Albu 1980); Jiu (Motru), Ialomița (Cure 1985).

D.* (*Diamesa*) *steinboecki Goetghebuer, 1933 (L)
Distribution: Olt (B Latorița), Jiu (Gilort, B Setea, Galben, Tismana, Q Basarabilor), Bistrița (B Bistricioara, B Borcuț, B Valea Seacă) (Cure 1985); Retezat Mts (Netiș, Radeș Rs) (Tatole 1994, 2004a).

D.* (*Diamesa*) *tonsa (Haliday, 1856) (I+L)
=*Diamesa* (*Diamesa*) *thienemanni* Kieffer, 1909
Distribution: Sinaia (Albu 1967a, 1980); Retezat Mts (Bucura, Porții, Lia Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1980, Cogălniceanu et al. 2009); Danube (Mraconia, Șvinița–Tișovița, Gura Fetii) (Cure 1972a); Lotru (Latorița) (Albu 1980, Cure 1985); Piatra Craiului (Șpârla Tămașului Br, Bârsa Mare, Bârsa Tămașului, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică, Unghia Mare Rs) (Tatole 2004c); Izvorul Muntelui Bicaz L (Izvorul Alb) (Plăvan 2010).

D.* (*Diamesa*) *valkanovi Saether, 1968 (L)
Distribution: West–Jiu (Cîmpul lui Neag, Cheile Gîrbovului), Retezat Mts (S Zănoaga) (Cure 1985).

(Diamesa) zernyi Edwards, 1933 (L)
Distribution: Retezat Mts (Galeș L) (Toth et al. 2017).

Nomina dubia in *Diamesa*

D. carpatica Botnariuc and Cure, 1956 (L)
Distribution: Bistrița (Fărcașa, Largu, Bistricioara, Putna, Bicaz DL: Izvorul Alb) Cure 1962); Danube (Coronini–Orșova, Oravița, Berzasca, Cozla, Mraconia, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Jiu (Motru, Gilort), Olt (Olteț, Teslui, Lotru), Râul Doamnei, Moldova (Cure 1985); Crișul Repede (downstream Oradea, Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someșul Mic (Gilău) (Cure 1985, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

D. heterodentata Botnariuc and Cure, 1954 (L)
Distribution: Danube (Cerna) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Motru (Apa Neagră), Lotru, Moldova (B Topolnița), Colentina (Ft Chitila) (Cure 1985); Crișul Repede (Fughiu, Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

D. inaequabilis Pankratova, 1950 (L)
Distribution: West–Jiu (Cheile Gârbovului) (Cure 1985).

D. pseudostylata Chernovskij, 1949 (L)
Distribution: West–Jiu (Câmpul lui Neag) (Cure 1985).

D. stylata Chernovskij, 1949 (L)
Distribution: Prahova (Predeal), Olteț, Lotru (B Latorița) (Cure 1985); Mureș (Bistra, Donca Rs) (Tatole 1996.

Genus ***Potthastia*** Kieffer, 1922

P. gaedii (Meigen, 1838) (L)
Distribution: Bistritza–Tal (Cure 1985); Mureș (Ilva, Ilva Mare, Gălăoaia, Gălăoaia Mică, Bistra, Mijlocu Cald Rs) (Tatole 1996); Crișul Repede (Fughiu) (Szitó and Mózes 1997).

P. longimana Kieffer 1922 (I+L)
=*Diamesa campestris* Edwards, 1929
Distribution: Sebeș Mts (Sebeș Br) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistricioara, Pintec, Bicaz DL (Izvorul Alb) (Cure 1962); Danube (Cerna, Vodița, Coronini–Orșova, Jiu–Olt (Cure 1963, Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Jiu (Tismana, B Tismănița, B Sadu), Olt (Olteț, B Văleana, B Rîbova, Lotru (B Păscoaia), Lotrișor V) (Albu 1980, Cure 1985); Moldova (B Moldovița, B Risca, B Ozana, Iza Albă), Prahova (Cure 1985); Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Someșul Mic (Gilău, upstr Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

Genus ***Pseudodiamesa*** Goetghebuer, 1939

P. (Pseudodiamesa) branickii (Nowicki, 1873) (I+L)
=*Syndiamesa branickii* Nowicki, 1873
Distribution: Retezat Mts ((Bucura, Caprelor, Gemenele, Negru, Știrbu, Zănoaga Ls, Râușor, Bârlii, Netiș Rs) (Albu 1972b, 1980, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Jiu (B Dîbna Mare), Doftana (Cure 1985); Crișul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997); Someșul Mic (upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (Someșul Cald) (Szitó and Mózes 1999); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2001); Olt (Făgăraș–Avrig, B Văleana) (Cure 1985, Tatole 2002); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Tămașului R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

P. (Pseudodiamesa) nivosa Goetghebuer, 1928 (I+L)
Distribution: Sebeș Mts (Sp near Șurianu) (Botnariuc 1956); Retezat Mts (Negru L, Văgăuna Neagră, Radeș Rs Gura Zlata) (Albu 1972b, 1980, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997); Cibin–Tal (Lăptici), Ialomița (Cheile Tătarului) (Cure 1985); Mureș (Ilva, Ilva Mare, Gălăoaia, Gălăoaia Mare, Bistra, Donca Rs) (Tatole 1996); Olt

(Făgăraş–Avrig, Cornetu, Gura Lotrului) (Tatole 1999, 2002); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

Genus ***Sympotthastia*** Pagast 1947

S. zavreli Pagast 1947 (I+L)
Distribution: Lotru (Cure 1985).

Genus ***Syndiamesa*** Kieffer 1918

S. hygropetrica (Kieffer 1909) (L)
Distribution: Danube (Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2004b).

Tribe **Protanypodini** Brundin, 1956
Genus ***Protanypus*** Kieffer, 1906

P. morio (Zetterstedt, 1838) (L)
Distribution: Crişul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997).

P. pseudomorio Makarchenko, 1982
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

SUBFAMILY **PRODIAMESINAE** Sæther, 1976
Genus ***Monodiamesa*** Kieffer, 1922

M. bathyphila (Kieffer, 1918) (L)
Distribution: Jiu (B Runcu, Fl Tismana) (Cure 1985); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Retezat Mts (Zănoaga L) (Cogălniceanu et al. 2009); Izvoru Muntelui Bicaz L (Taşca (46°57'27'N, 26°04'39"E), Ceahlău) (Dascălu et al. 2009, Plăvan 2010).

Genus ***Odontomesa*** Pagast,1947

O. fulva (Kieffer, 1919) (I+L)
Distribution: Cerna (Albu and Cure 1975); Tismana–Tal (Cure 1985).

Genus ***Prodiamesa*** Kieffer, 1906

P. olivacea (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Sebeş Mts (Sebeş R, Oaşa L) (Botnariuc 1956); Izvorul Muntelui Bicaz DL (Potoci, Izvorul Alb, Ceahlau, Taşca: 46°57'27"N, 26°04'39"E) (Cure 1962, Plăvan 2007, Dascălu et al. 2009, Plăvan 2010); Danube (Nera, Mraconia, Şaica P, Mahâru

Pump Station, Cărăbulea I, km 514, Ch Penciu, Gostinu Ch, Slobozia P, upstream Mostiștea) (Cure 1963, Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Sinaia (Albu 1967a); Retezat Mts (Bucura, Caprelor, Gemenele, Negru, Știrbu, Viorica, Zănoaga Ls, Radeș, Văgăuna Neagră Rs) (Albu 1972b, Botnariuc et Tatole, 1997, Tatole 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Moldova (B Fundul Moldovei, B Slătioara, B Uzului, Izvorul Alb), Jiu (Motru, Tismana), Lotru (B Latorița) (Cure 1985); Alah Bair Sp (Prunescu–Arion et Tatole 1986); Mureș (Izvorul Mureș, Răstolița, Iernut) (Cure, 1985, Szitó 1995); Barcău R (Sârg) (Szitó 1997); Crișul Negru (Poiana, Tinca), Crișul Repede (Fughiu, Tbs Drăgan, Iad, Zârna) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj, confluence Arin Br) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Breaza, Sâmbăta, Vișlea Mare Rs, Turnu, Călimănești) (Tatole 1999); Someșul Mic (Gilău, Apahida) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2001); Piatra Craiului (Vlădușca, Curmătura, Dâmbovicioara Rs) (Tatole 2004b, 2007); North Dobroudja (Smârdan A) (Tatole 2009).

P. rufovittata Goetghebuer 1932 (L)
Distribution: Bistrița, Izvorul Muntelui Bicaz L (Ceahlău) (Cure 1962, 1985, Plăvan 2010); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

SUBFAMILY **ORTHOCLADIINAE** Kieffer, 1911
Genus ***Acricotopus*** Kieffer, 1921

A. lucens (Zetterstedt, 1850) (I+L)
Distribution: Jiu, Prahova (Brazi, Bâlbâitoarea), Mostiștea, Ft Frăsinet (Cure 1985); Olt (Făgăraș–Avrig) (Tatole 2002); Chirnogi, Eșelnița (Albu and Cure 1975, Tatole 2003b).

Genus ***Brillia*** Kieffer, 1913

B. bifida (Kieffer, 1909) (I+L)
=*Brillia modesta* Meigen, 1830
Distribution: Sebeș Mts (Bistra Tb at Tău, Sebeș Br) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Corbului Br, Grințieșul Mare) (Cure 1962); Vinului V–Vișeul de Sus, Borșa (Albu 1963, 1966b); Retezat Mts (Viorica, Negru, Ana, Lia Ls, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Danube (Eșelnița, Cerna, Vodița) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Jiu (Câmpușel, Gilort, Tismăniţa), Moldova (Slătioara) (Cure 1985); Vâlsan R (Tatole 1993c); Mureș (Răstolița, Mijlocu Rs) (Szitó 1995, Tatole 1995); Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Prahova (Predeal, Sinaia–Peleș, Valea Cerbului, Câmpina) (Cure 1985, Preda et al. 2001, 2004); Olt (Olteț: Sp in Polovraci-Baia de Fier area, Lotru, Urlieș, Târlia, Văleana, Câineni, Făgăraș–Avrig) (Rogoz 1972, Cure 1985, Tatole 2002, 2003b); Piatra Craiului (Saivane Sp, Bârsa Mare P, Bârsa Tămașului Br, Bârsa Tămașului R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

B. flavifrons (Johannsen, 1905)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

B. longifurca Kieffer, 1921 (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1968); Moldova (Baia), Olteț (Alunul) (Cure 1971); Jiu (Rovinari, Tismăniţa); Olt (Baboia, Olteţ, Teslui, Lotru) (Cure 1985, Tatole 2003b); Crișul Alb (Brad), Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Prahova (Predeal, Poiana Ţapului, Sinaia, Valea Cerbului) (Cure 1985, Preda et al. 2001); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Parâng Mts (Oaşa L, Sebeș R), Fagăraş Mts (Sâmbăta, Râul Doamnei Rs), Baiului Mts (Unghia Mică R) (Tatole 2004c).

Nomina dubia in *Brillia*

B. immaculata Botnariuc and Cure, 1956 (L)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Borul Br, Corbul Br, Putna) (Cure 1962); Danube (Sulina, Sf. Gheorghe As) (Cure 1963); Argeș (Valea cu Pești), Jiu (B Sadu, Tismana), Olt (Olteț, B), Trotuș (B Uzului), Sebeș (S Oașa) (Cure 1985); Mureș (Răstolița, Tihu Rs) (Tatole 1995); Retezat Mts (Gemene L) (Botnariuc and Tatole 1997); Prahova (Doftana, Valea Cerbului) (Cure 1985, Preda et al. 2004); Fagăraș Mts (Râul Doamnei) (Tatole 2004c); Retezat Mts (Negru) (Fjellheim et al. 2009).

B. pallida Tshernovskii, 1949 (L)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Schit) (Cure 1962); Danube (Porțile de Fier, Sulina, Sf. Gheorghe), Jiu (Câmpul lui Neag), Mureș (Deva, Iernut), Someșul Mic (Gilău) (Albu and Cure 1975, Cure 1985).

Genus ***Bryophaenocladius*** Thienemann, 1934

B. flexidens (Brundin, 1947) (I)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Tatole 1993b, 2003b).

B. ictericus (Meigen, 1830) (I)
Distribution: Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 1993b, 2004c).

B. illimbatus (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Cerna, Topleț, Mraconia (Albu and Cure 1975); Mureș (Luduș), Olt (Râul Vadului) (Tatole 2003b).

B. inconstans (Brundin, 1947) (I)
Distribution: Olt V, Porțile de Fier: Eșelnița (Albu and Cure 1975, Tatole 1993b, 2003b).

B. nidorum (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a); Danube (Mraconia, Cerna) (Albu and Cure 1975); Jiu (Tismana) (Tatole 2003b).

***B.* nigrus** Albu, 1974 (I)
Distribution: Eșelnița (Porțile de Fier) (Albu 1974).

B. nitidicollis (Goetghebuer, 1913) (L)
Distribution: Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Someș (downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999).

B. pectinatus Albu, 1974 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1974); Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974).

B. scanicus (Brundin, 1947) (I)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a); Danube (Dubova, Eșelnița) (Albu and Cure 1975).

B. subvernalis (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Bucura, Știrbu Ls, Văgăuna Neagră R, Dobrun, Zlătuia, Râușor Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 1994, 2003b, 2004a, 2004c, Cogălniceanu et al. 2009); Prahova (Sinaia), Jiu (Livezeni), Olteț (in gorge) (Tatole 1993b); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998), Retezat Mts (Stirbu) (Fjellheim et al. 2009).

B. tuberculatus (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Danube (Crusoviţa, Dubova) (Albu and Cure 1975); Olt Tal (Cure, 1985).

Genus ***Camptocladius*** van der Wulp 1874

C. stercorarius (De Geer, 1776) (I+L)
=*Tipula byssina* Schrank, 1803
Distribution: Hermannstadt (Sibiu) (3 Eche) (Strobl 1896); Chirnogi, Cotmeana, Neajlov–Tal (Albu 1966a); Retezat Mts (Negru, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a); Danube (Porțile de Fier–Bahna), Olt (Drăgășani, Lotru V at Obârşia Lotrului) (Cure 1985).

Genus ***Cardiocladius*** Kieffer, 1912

C. capucinus (Zetterstedt, 1850)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013.

C. fuscus Kieffer, 1924 (L)
Distribution: Crișul Repede (Fughiu) (Szitó and Mózes 1997).

C. leoni Goetghebuer, 1932 (I)
Distribution: Cazane (Albu 1966a); Near Gaura cu muscă Cave (Tatole 2003b).

Genus ***Chaetocladius*** Kieffer, 1911

C. (Chaetocladius) acuticornis (Kieffer, 1914) (L)
Distribution: Gura Fetii (Donau); Jiu (oberhalb Petrila, B Sadu, Tismana) (Cure 1985).

C. (Chaetocladius) dentiforceps (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Retezat Mts (Galeș L) (Toth et al. 2017).

C. (Chaetocladius) dissipatus (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Retezat Mts (Negru L, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b).

C. (Chaetocladius) gelidus Brundin, 1956 (L)
Distribution: Retezat Mts (Negru L) (Albu 1972b, Tatole 2003b).

C. (Chaetocladius) gracilis Brundin, 1956
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013.

C. (Chaetocladius) laminatus Brundin, 1947 (L)
Distribution: Jiu (Cîmpul lui Neag, B Gîrbova, Petrila), Olt (Teslui), Dâmbovița (Moroieni) (Cure 1985).

C. (Chaetocladius) perennis (Meigen, 1818) (I)
Distribution: Sinaia, Muntele Mic, Olt (Tatole 2003b).

C. (Chaetocladius) piger (Goetghebuer, 1913) (L)
Distribution: Donaudelta (Gîrla Iacubova) (Cure 1985); Retezat Mts (Negru, Zănoaga, Galeș Ls) (Cogălniceanu et al. 2009; Fjellheim et al. 2009; Toth et al. 2017); Făgăraș (Bâlea L: 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

C.* (*Chaetocladius*) *sueccicus (Kieffer, 1916) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Porții L, Bârlii, Zlătuia, Netiș Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c, Cogălniceanu et al. 2009).

C.* (*Chaetocladius*) *vitellinus (Kieffer, 1908) (L)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, B Borului) (Cure 1962); Ialomița (Cure 1985); Retezat Mts (Netiș R) (Tatole 1994).

Genus ***Clunio*** Haliday, 1855

C. marinus Haliday, 1855 (I+L)
Distribution: Marea Neagră (Agigea) (Cărăușu 1939, Albu 1966).

Genus ***Corynoneura*** Winnertz, 1846

C. arctica Kieffer, 1923 (L)
Distribution: Retezat Mts (Galeș L) (Toth et al. 2017).

C. celeripes Winnertz, 1852 (L)
Distribution: Danube (Nera, Crușovița, Cozla, Cerna, Balina, Porțile de Fier: Gura Fetii) (Cure 1972a); Jiu (Tismana, Motru), Olt (Olteț, B Văleana), Argeș (Valea cu Pești), Trotuș (B Uzului), Bistrița (Bicaz), Someșul Cald (Călineasa), S Victoria, Spf Bîlbîitoarea (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene, Zănoaga) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Crișul Repede (Sp area) (Szitó and Mózes 1997); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Prahova (Predeal, Azuga, Valea Cerbului) (Preda et al. 2001, Tatole 2004c); Olt (Olteț: Sp in Polovraci-Baia de Fier area, Făgăraș–Avrig) (Rogoz 1972, Tatole 2002); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului, Padina Hotarului Brs, Bârsa Mare, Bârsa Tămașului, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Fagăraș Mts (Râul Doamnei), (Tatole 2004c); North Dobroudja (Smârdan A) (Tatole 2009).

C. celtica Edwards, 1924 (I)
Distribution: Muntele Mic (Albu 1966b); Porțile de Fier, Sinaia (Tatole 2003b).

C. coronata Edwards, 1924 (I)
Distribution: Neajlov–Tal (Albu 1966b).

C. edwardsi Brundin, 1949 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Negru, Gemenele Ls, Râușor R) (Albu 1972b, Tatole 1994, 2003b); Făgăraș Mts (Bâlea L: 45°36'11"N 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

C. lacustris Edwards, 1924 (L)
Distribution: Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Retezat Mts (Ascuns L) (Cogălniceanu et al. 2009).

C. lobata Edwards, 1924 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Ana, Lia, Bucura, Negru, Știrbu, Galeș Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009, Toth et al. 2017); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

C. scutellata Winnertz, 1846 (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Chirnogi, Giurgiu, Dîmbovnic–Tal (Albu 1966a, 1967b, Albu and Botnariuc 1966); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Negru, Gemenele, Bucura, Lia, Florica, Iezilor, Porții, Radeș II, Zănoaga Ls Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Someș (Someșul Cald) (Szitó and Mózes 1999); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2001, 2004); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Mare P, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a. 2004b, 2007); Fagăraş Mts (Viștea Mare, Râul Doamnei Rs) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Smârdan A) (Tatole 2009).

Nomen dubium in *Corynoneura*

C. lemnae Schiner in Frauenfeld, 1866 (L)
Distribution: Crișul Repede (Fughiu) (Szitó et Mózes,1997).

Genus ***Cricotopus*** van der Wulp, 1874

C. (Cricotopus) albiforceps (Kieffer, 1916) (I+L)
Distribution: Crișul Repede (upstream Odorhei) (Szitó and Mózes 1997); Cerna, Topleţ (Albu and Cure 1975, Tatole 2003b).

C. (Cricotopus) algarum (Kieffer, 1911) (I+L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc et Cândea 1953a); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Lopatna Ch, Ghiolul Orechovo, Tri–Ozera, Sahaua Ledeancei, Musura, Cordon, Obretinul Mare) (Botnariuc et Cândea 1953a,b); Sebeș Mts (Gotu Br, Gotu Brook at waterfall, Sebeș Br, Db Sebeș R) (Botnariuc 1956); Bistrița (Hangu, Buhalnița, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Răchițișul Mare, Borul Br, Putna, Pintec, Valea Seacă), Bicaz DL (Potoci, Izvorul Alb, Ceahlau) (Cure 1962); Danube (Nera, Bozneațca, Camenița, Oravița, Berzasca, Cozla, Elişeva, Liuborajdea, Plavișevița, Mraconia, Cerna, Vodița, Coronini–Orșova, Sp area Porțile de Fier, Gura Fetii, Mahâru Station, Şaica Pond, Slobozia Pond-Fish Farm, Forest Penciu Ch, Gostinu Ch, Mostiștea Ch, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A, Meleaua Sacalin near Sf. Gheorghe A (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure

1975, Tatole 1983, 2005); Dăbuleni (Ascunsa Sp and Br) (Tatole et al. 1994); Retezat Mts (Zănoaga L, Zlătuia R) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Crișul Repede (Sp area, Aleșd, upstream Odorhei, Cheresig, Fughiu, downstream Oradea, Drăgan R) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Someşul Mic (upstream and downstream Cluj–Napoca, Gilău, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999); Olt (Turnu, Gura Lotrului, Cornetu,Vișstea, Scoreiu, Făgăraș–Avrig) (Tatole 1999, 2002); Piatra Craiului (Șpârla Tămașului Br, Bârsa Mare P Bârsa Tămașului, Dâmbovicioara (Cheile Dâmbovicioarei) Rs (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Fagăraș Mts (Arpașu Mare R) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009).

C. (Cricotopus) annulator Goetghebuer, 1927 (I+L)
=*Cricotopus alpestris* Goetghebuer, 1941
=*Cricotopus* (*Cricotopus*) *bituberculatus* Goetghebuer, 1934
Distribution: Bistrița (Largu, Schit, Izvorul Alb, Bistricioara, Borul Br) (Cure 1962); Chirnogi (Albu 1966a); Muntele Mic (Albu 1966b); Sinaia (Albu 1966b); Danube (Berzasca, Cozla, Cerna, Balina, Mraconia, Spring area Porțile de Fier (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c); Moldova (Câmpulung), Prahova (Poiana Țapului–Predeal), Ialomița, Jiu (Tismana, Motru, Gilort), Olteț (Alunu) (Cure 1985); Mureș (Răstolița, Tihu, Mijlocu Rs) (Tatole 1995); Crișul Repede (Sp area) (Szitó and Mózes 1997); Baiului Mts (Unghia Mică R) (Tatole 2004c).

C.* (*Cricotopus*) *bicinctus (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Chirnogi, Budești, Rîul Doamnei (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966, Albu 1967b); Ada–Kaleh, Eșelnița (Albu and Cure 1975); Jiu (Cheile Gârbovului, downstream Petrila, Petroșani, Rovinari, Tismana, Tismăniţa B), Prahova (downstream Predeal), Olteţ, Râul Doamnei, Dâmbovița, Argeș (Zeama Rece, Budeşti, Copăceni) (Cure 1985); Mureș (Seneta) (Szitó 1995); Crișul Negru (Borz), Crișul Repede (downstream Ciucea, Fughiu, downstream Oradea, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea 1999); Someşul Mic (Gilău, Apahida, Gherla, upstream and downstream Cluj–Napoca) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Someș (upstream Cluj, downstream Năsăud, downstream Beclean, downstream Dej, Odorhei, Sălsig) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Vișstea, Voila, Turnu, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Piatra Craiului (Șpârla Tămașului Br) (Tatole 2003a, 2004b); Caransebeş (Tatole 2003b); Fagăraş Mts (Breaza, Vâlsan, Râul Doamnei Rs), Baiului Mts (Unghia Mică, Azuga confluece Unghia Mică, confluence Unghia Mare) (Tatole 1993c, 2004c); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009); Cefa Nature Park (Ateaș) (Pavelescu 2012).

C.* (*Cricotopus*) *caducus Hirvenoja, 1973 (I)
Distribution: Portița, Chirnogi (Tatole 2003b).

C.* (*Cricotopus*) *curtus Hirvenoja, 1973 (I+L)
Distribution: Muntele Mic, Dâmbovnic (Argeş), Jiu, FT Gologan (OE) (Cure 1985); Sinaia (Tatole 2003b); Piatra Craiului (Şpârla Tămaşului Br, Bârsa Mare R) (Tatole 2004b, 2007); Fagăraş Mts (Râul Doamnei) (Tatole 2004c); Retezat Mts (Bucura, Bucurel, Gemenele, Porţii Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

C. (Cricotopus) cylindraceus (Kieffer, 1908) (L)
Distribution: Crişul Repede (downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someşul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

C.* (*Cricotopus*) *festivellus (Kieffer, 1906) (I+L)
Distribution: Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Sinaia (Tatole 2003b, 2004c).

C.* (*Cricotopus*) *flavocinctus (Kieffer, 1924) (I+L)
Distribution: Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Donaudelta (S Roşuleţ), Ft Frăsinet, Jiu (Petrila), Dâmboviţa (Moroieni), Fl Dâmbovnic (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007); North Dobroudja (Telincea L, Babadag L) (Tatole 2009).

C. (Cricotopus) fuscus (Kieffer, 1909) (I+L)
=*Cricotopus biformis* Edwards 1929
Distribution: Bistriţa (Fărcaşa, Galu, Largu, Hangu, Bistricioara, Izvorul Alb, Borul Br, Putna), Bicaz DL (Potoci) (Cure 1962); Danube (Bozneaţca, Aliberg, Liuborajdea, Berzasca, Cozla, Balina, Vodiţa, Mraconia, (Şaica P, Slobozia P: Fish Farm, Forest Penciu Ch, Gostinu Ch, upstream Mostiştea Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Neajlov–Tal (Albu 1966b); Donaudelta (S Roşu), Argeş (S Zeama Rece, Vâlsan, Dâmbovnic, Valea cu Peşti), Prahova (Poiana Ţapului, Predeal, Cricovul Dulce), Ialomiţa (B Ialomicioara), FT Frăsinet, S Victoria, Spf Făget (Cure 1985); Retezat Mts (Porţii, Ştirbu, Zănoaga Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Crişul Repede (upstream Odorhei, Iad) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Olt (Făgăraş–Avrig, Olteţ, Lotru, Cârţa, B Urlieş) (Cure 1985, Tatole 2002); Piatra Craiului (Padina Hotarului Br, Bârsa Mare, Bârsa Tămaşului, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Iezer-Păpuşa Mts (Brătia R, Râul Doamnei) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Taiţa L) (Tatole 2009).

C.* (*Cricotopus*) *pallidipes Edwards, 1929 (I)
Distribution: Crapina–Jijila (Popina) (Tatole 2003b).

C.* (*Cricotopus*) *septentrionalis Hirvenoja, 1973 (I)
Distribution: Sinaia (Tatole 2003b).

C. (Cricotopus) similis Goetghebuer, 1921 (I+L)
=*Cricotopus* (*Cricotopus*) *decorus* Goetghebuer, 1927
Distribution: Sinaia (Albu 1968a); Retezat Mts (Bârlii, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a); Cerna (Albu and Cure 1975); Iezer-Păpușa Mts (Brătia, Râul Doamnei), Bucegi Mts (Azuga, Predeal) (Tatole 2004c).

C. (Cricotopus) tibialis (Meigen, 1804) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Neajlov–Tal (Albu 1966a, 1967b); Prahova (Câmpina, Poiana Țapului) (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Șpârla Tămașului Br, Bârsa Mare P, Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007); North Dobroudja (Smârdan A). (Tatole 2009

C. (Cricotopus) tremulus (Linnaeus, 1758) (I+L)
Distribution: Prahova (Brazi), Q Șviniţa (Eisernes Tor) (Cure 1985); Crișul Repede (Sp area, Fughiu) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someșul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău, Apahida) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare Bârsa Tămașului, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Lotru V (Tatole 2003b).

C. (Cricotopus) triannulatus (Macquart, 1826) (I+L)
Distribution: Danube (Ada–Kaleh, Mocanu Is) (Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Prahova (Sinaia, Bușteni) (Albu 1968a, Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

C. (Cricotopus) trifascia Edwards, 1929 (I+L)
Distribution: Danube (Nera) (Cure 1972a); Cerna (Albu and Cure 1975); Bistriţa, Moldova, Ialomiţa, Casimcea, Prahova, S Gălăţui (Cure 1985); Crișul Negru (Știei), Crișul Repede (Sp area, Aleșd, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (downstream Dej) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Cornetu–Danube) (Tatole 2002); Sinaia (Tatole 2003b).

C. (Cricotopus) vierriensis Goetghebuer, 1935 (I+L)
=*Cricotopus* (*Cricotopus*) *pseudosimilis* Goetghebuer, 1939
Distribution: Sinaia (Albu 1968a); Cerna, Topleţ, Sviniţa (Albu and Cure 1975, Tatole 2003b); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, Tatole 2007); Olt V (Tatole 2003b); Fagăraş Mts (Vișstea Mare, Arpașu Mare Rs) (Tatole 2004c).

C. (Isocladius) dobrogicus Albu, 1964 (I)
Distribution: Crapina–Jijila, S Tașaul, Chirnogi (Albu 1964b, 1966, 1967b); Sahalin (Sf. Gheorghe A), Sulina A, Razelmul Mare (Tatole 2003b).

C. (Isocladius) intersectus (Staeger, 1839) (L)
Distribution: Retezat Mts (Tăul dintre Brazi, 1740m: 45°23'47"N, 22°54'06"E) (Galeş L, 1990 m) (Tóth et al. 2015, 2017).

C. (Isocladius) laetus Hirvenoja, 1973 (I)
Distribution: Gilort (Jiu) (Cure 1985).

C. (Isocladius) ornatus (Meigen, 1818) (I)
=*Chironomus oscillator* (Meigen, 1818)
Distribution: Crapina–Jijila, Chirnogi (Albu 1966a, 1967b, Albu and Botnariuc 1966).

C. (Isocladius) pilicauda Hirvenoja, 1973 (I)
Distribution: Orşova (Tatole 2003b).

C. (Isocladius) pilitarsis (Zetterstedt, 1850) (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1968a).

C. (Isocladius) reversus Hirvenoja, 1973 (I)
Distribution: B Peţea (Crişul Repede) (Cure 1985).

C. (Isocladius) sylvestris (Fabricius, 1794) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Melea, Gârla Lopatna, Lopatna Ch Ghiolul Orechovo, Sahaua Ledeancei, Furtuna, Melea, Musura, Cordon, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953a, 1953b); Mangalia L (Botnariuc and Cândea 1953a); Bistriţa (Buhalniţa, Bistricioara, Schit, Secu), Bistricioara (Răchiţişul Mare, Corbul Br), Bicaz DL (Izvorul Alb, Hangu, Bistriţa upstream lake) (Cure 1962, Plăvan 2010, Plăvan et al. 2012); Danube (Bozneaţca, Berzasca Coronini–Orşova, Jiu–Olt, Slobozia P–Fish Farm, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A, Sf. Gheorghe A, Meleaua Sacalin) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 1983, 2005); Crapina–Jijila, Chirnogi, Budeşti, Berteşti, Taşaul–See, Neajlov–Tal (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966a, 1967b, Botnariuc and Albu 1966b, Botnariuc et al. 1969); Berteşti, Hîrşova–Brăila (Botnariuc et al. 1966); Argeş, Bistriţa, Casimcea, Jiu, Ft Frăsinet (Cure 1985); Sărăturile L (Dobrogea) (Popescu–Marinescu et Năstăsescu 1987); Mureş (Răstoliţa, Tihu, Gălăoaia, Cofu, Bistra, Mijlocu Cald, Stegea Rs) (Tatole 1995, 1996b); Crişul Repede (upstream Odorhei, Fughiu, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999); Someşul Mic (downstream Cluj–Napoca, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someş (Someşul Cald, downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Făgăraş–Avrig, Turnu, Călimăneşti) (Tatole 1999, 2002); Poiana Braşov, Topolog V (Tatole 2003b); Retezat Mts (Ana, Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E) (Cogălniceanu et al. 2009, Tóth et al. 2015); North Dobroudja (Sărat L) (Tatole 2009).

C.* (*Isocladius*) *trifasciatus (Meigen, 1810) (L)
Distribution: Prahova (Brazi, Sinaia, Azuga) (Cure 1985, Tatole 2004c); Crișul Repede (Fughiu) (Tudorancea 1999); Someșul Mic (Gilău, Apahida) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

C.* (*Paratrichocladius*) *nivalis (Goetghebuer, 1938) (L)
Distribution: Ialomița (Cheile Tătarului) (Cure 1985); Someșul Mic (Gilău); (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

C.* (*Paratrichocladius*) *rufiventris (Meigen, 1830) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c); Olt (Muereasca R), Sinaia (Tatole 1985, 2003b, 2004c); Piatra Craiului (Vlădușca R) (Tatole 2007).

C.* (*Paratrichocladius*) *skirwithensis (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Cheile Tătarului (Tatole 2003b).

Nomen dubium in *Cricotopus*

C. latidentatus Chernovskii, 1949 (L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Sahaua Văcarului, Cuibeda, Obretinul Mare) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Bistrița Galu, Bistricioara) (Cure 1962); Donau (Nera, Cerna, Cozla Sf. Gheorghe A, Sulina A), Dâmbovița, Jiu (Tismana), Prahova (Azuga), Someșul Cald (Dâlboaca) (Cure 1963, 1972a, 1985, Albu and Cure 1975); Crișul Repede (Fughiu, Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Diplocladius*** Kieffer, 1908

D. cultriger Kieffer, 1908 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Caprelor, Florica, Negru, Stânișoara, Lia Ls, Râușor, Bârlii, Netiș, Râușor, Bistra Rs) (Albu 1972b, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Dăbuleni („parcela muzeu", Ascunsa Sp and Br) (Tatole et al. 1994); Mureș (Răstolița, Tihu, Ilva, Ilva Mare, Gălăoaia, Gălăoaia Mare, Gălăoaia Mică, Cofu, Bistra, Mijlocu, Cald, Stegea Rs) (Tatole 1995, 1996b); Cheile Tătarului (Ialomița) (Tatole 2003b); Baiului Mts (Roșu Br, Retevoi Br, Unghia Mică R) (Tatole 2004c).

Genus ***Epoicocladius*** Sulc et Zavrel, 1924

E. ephemerae (Kieffer, 1924) (L)
=*Epoicocladius flavens* (Malloch 1915)
Distribution: Bistrița (B Brului, B Corbul), Trotuș (B Uzului), Jiu (Tismana) (Cure 1985); Crișul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someșul Mic (downstream Cluj–Napoca, Apahida) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007).

Genus ***Eukiefferiella*** Thienemann, 1926

E. brehmi Gowin, 1943 (L)
Distribution: Crișul Repede (Drăgan), Someșul Mic (downstream Cluj–Napoca, Apahida) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

E. brevicalcar (Kieffer, 1911) (I+L)
Distribution: Sebeș Mts (Gotu Br) (Botnariuc 1956); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Gemene, Negru, Viorica, Ana, Lia, Știrbu Ls, Netiș, Râul Mare Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a, Cogălniceanu et al. 2009); Danube (Nera, Ada–Kaleh, Cerna, Topleț) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2003b); Jiu (B Câmpușel, B Tismăniţa, B Petroșeni), Bistriţa (B Tarcău), Prahova (Azuga–Predeal), Gologan, Q bei Cetate (Cure 1985); Olt (Scoreiu, Vișstea Brezii, Valea Caşilor Rs) (Tatole et Prunescu–Arion 1992, Tatole 1999, 2004c); Crișul Repede (downstream Ciucea, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Cald, Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului, Șpârla Tămașului Brs, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, Tatole 2007); Sinaia (Tatole 2003b).

E. claripennis (Lundbeck,1898) (I+L)
=*Spaniotoma hospita* Edwards, 1929
=*Eukiefferiella stylifer* Goetghebuer, 1949
Distribution: Neajlov–Tal (Albu 1966b); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Gemenele, Galeș L, Bârlii Br, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a, 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Toth et al. 2017); Danube (Iron Gates, Șaica P, Slobozia P–Fish Farm, Forest Penciu Ch, Gostinu Ch) (Cure 1985, Tatole 2005); Jiu (Livezeni, (B Câmpușel) (Cure 1985); Olt (Avrig,Vișstea,Voila, Dridif Rs, Cornetu–Danube) (Tatole et Prunescu–Arion 1992, Tatole 1999, 2002); Someșul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău, Apahida) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br) (Tatole 2003a, 2004b); Sinaia, Teleorman V (Tatole 2003b); Baiului Mts (Azuga R, Unghia Mică R, Azuga R confluence Unghia Mică R) (Tatole 2004c); Făgăraș Mts (L Bâlea: 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

E. clypeata (Kieffer, 1923) (I+L)
Distribution: Danube (Plavișevița) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Olt (Lotru: B Păscoaia, Olteț: B Văleana), Jiu (B Sadu), Ialomița (Cure 1985); Retezat Mts (Zlătuia, Râul Mare Rs) (Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a); Crișul Repede (Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someș (downstream Năsăud, Pomi, Păulești, Vetiș) (Szitó and Mózes 1999); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului, Șpârla Tămașului Brs, Bârsa Mare, Vlădușca, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007).

E. coerulescens Kieffer, 1926 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata, Zlătuia R) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b); Crișul Alb (Chișinău Criș) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999); Sinaia (Tatole 2003b).

E. cyanea Thienemann, 1936 (L)
Distribution: Crișul Repede (Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Retezat Mts (Bucura, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

E. devonica (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b).

E. ditmari Lehman, 1972 (L)
Distribution: Olt (Muereasca) (Tatole 1985).

E. fittkaui Lehmann, 1972 (L)
Distribution: Retezat Mts (Galeș L 1990 m) (Toth et al. 2017).

E. gracei (Edwards, 1929) (L)
=*Eukiefferiella longicalcar* Thienemann, 1926
Distribution: Sebeș Mts (Sebeș Br) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistrița, Fărcașa, Galu, Largu, Hangu, Buhalnița, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Secu, Izvorul Muntelui, Bicaz, Borul, Putna, Pintec) (Cure 1962); Danube (Aliberg, Oravița, Berzasca, Cozla, Cerna, Vodița, Porțile de Fier DL, Coronini–Orșova, km 502, upstream Mostiștea, Mostiștea Ch, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A, Sf. Gheorghe A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Argeș (Vâlsan R) (Stoica 1967); Retezat Mts (Gemene, Agățat, Florica, Gemenele, Negru, Știrbu, Zănoaga Ls, Radeș R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Argeș, Jiu, Moldova, Someșul Cald, S Victoria (Dolj) (Cure 1985); Mureș (Răstolița, Tihu, Gălăoaia, Gălăoaia Mare Rs) (Cure 1985, Tatole 1995, 1996b); Crișul Negru (Știei) (Szitó and Mózes 1997); Someș (downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999); Someșul Mic R (upstream Cluj–Napoca, Gilău, Gherla) (Cure 1985, Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Crișul Repede (Fughiu) (Tudorancea 1999);

Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Mare P, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2004); Fagăraş-Iezer Păpuşa Mts (Vâlsan, Brătia Rs) (Tatole 1993c, 2004c).

E. lobifera Goeghebuer, 1934 (L)
Distribution: Prahova (Teişani Sp) (Cure 1985); Someş (Someşul Cald, Someşul Rece) (Szitó and Mózes 1999).

E. minor (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Retezat Mts (Negru, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a); Sinaia, Cheile Tătarului (Tatole 2003b).

E. pseudomontana Goetghebuer, 1935 (I)
Distribution: Muntele Mic (Tatole 2003b).

E. similis Goetghebuer, 1939 (I+L)
Distribution: Sebeş Mts (Sebeş R) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Bistricioara, Răchiţişul Mare, Borul Br, Corbul Br, Putna, Pintec, Valea Seacă, Grinţieşul Mare) (Cure 1962); Danube (Coronini–Orşova, spring area at Porţile de Fier) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Jiu (Cîmpul lui Neag, Tismana) (Cure 1985); Mureş (Răstolita, Tihu, Mijlocu Rs) (Tatole 1995); Crişul Negru (Ştei) (Szitó and Mózes 1997); Someş (Someşul Cald, Someşul Rece) (Szitó and Mózes 1999); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Retezat Mts (Bucura, Negru, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009).

Nomina dubia in *Eukiefferiella*

E. dzintari Pankratova,1959 (L)
Distribution: Prahova (B Urlătoarea Mare) (Cure 1985); Retezat Mts (Râul Mare) (Tatole 2004a).

E. longipes Tshernovskii, 1949 (L)
Distribution: Bistriţa (Hangu, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Borcut, Răchiţişul Mare, Borul Br, Putna, Valea Seacă, Grinţieşul Mare) (Cure 1962); Danube (Nera, Liuborajdea, Berzasca, Cozla, Cerna), Spring area at Porţile de Fier, Coronini–Orşova, Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea A, Sulina A, Sf. Gheorghe A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Argeş, Bistriţa, Casimcea, Jiu, Mureş, Olt, StS Bicaz (Cure 1985); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

E. quadridentata Tshernovskii, 1949 (L)
Distribution: Bistriţa (Fărcaşa, Galu, Largu, Hangu, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Bicaz, Putna) (Cure 1962); Danube (Elişeva, Cozla, Plavişevita, Cerna, Vodiţa, DL Porţile de Fier: Bahna) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Crişul

Repede (Spring area) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Făgăraş-Iezer Păpuşa Mts (Râul Doamnei, Brătia R), Baiului Mts (Unghia Mică R, Azuga R confluence Unghia Mică, confluence Unghia Mare) (Tatole 2004c).

Genus ***Georthocladius*** Strenzke, 1941

G. (Georthocladius) retezati (Albu, 1972) (I)
Distribution: Retezat Mts (Lia L, Gura Zlata) (Albu 1972a,1972b).

Genus ***Gymnometriocnemus*** Edwards, 1932

G. (Gymnometriocnemus) subnudus (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Barcău R (Boghiş) (Szitó,1997).

Genus ***Halocladius*** Hirvenoja, 1973

H. (Halocladius) fucicola (Edwards, 1926) (L)
Distribution: Delta Dunării (Szitó 1994); (Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someşul Mic (Gilău, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

H. (Halocladius) millenarius (Santos Abreu, 1918) (L)
=*Halocladius stagnorum* Goetghebuer, 1937
Distribution: Danube Delta (Szitó 1994).

Nomen dubium in *Halocladius* (L)

H. vitripennis (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Crişul Repede (Fughiu, downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

Genus ***Helleniella*** Gowin, 1943

H. extrema Albu, 1972 (I)
Distribution: Retezat Mts (Tăul Negru) (Albu 1972a, 1972b).

H. ornaticolis (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Muntele Mic, Gălbinaşi (Dâmbovița meadow) (Albu 1966b); Retezat Mts (Gura Zlata, Râuşor, Zlătuia Rs) (Albu 1974a, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997); Motru (Apa Neagră) (Cure 1985); Piatra Craiului (Şpârla Tămaşului Br, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Sinaia, Câineni (Tatole 2003b).

Genus ***Heterotanytarsus*** Spärck, 1923

H. apicalis (Kieffer,1921) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Netiș, Radeș, Zlătuia Rs Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b, Tatole 2004a); Bistriţa (Bicaz), Trotuş (Uzlui), Jiu (Câmpuşel, Tismăniţa) (Cure 1985); Vâlsan R (Tatole 1993c); Mureș (Ilva, Ilva Mare, Gălăoaia, Gălăoaia Mare, Gălăoaia Mică Rs) (Tatole 1996).

Genus ***Heterotrissocladius*** Spärck, 1923

H. marcidus (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Sebeș Mts (Spring near Șurianu, Gotul Sp, Db Sebeș R, Tăul Șurianu) (Botnariuc 1956); Retezat Mts (Bucura, Caprelor, Lia, Negru, Porții, Stânișoara, Știrbu Gemene, Galeș Ls, Râușor, Bârlii, Radeș Rs) (Albu 1972b, Tatole 1994, 2004c, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009, Toth et al. 2017); Olteţ (rheokrene Quelle), Jiu (B Câmpuşel) (Cure 1985); Făgăraş (Bâlea L: 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

H. subpilosus (Kieffer, 1911) (L)
Distribution: Someșul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Hydrobaenus*** Fries, 1830

H. lugubris Fries, 1830 (L)
=*Trissocladius griseipennis* Goetghebuer, 1913
Distribution: Danube Delta (Szitó 1994).

Genus ***Hydrosmittia*** Ferrington et Sæther, 2011

H. oxoniana (Edwards, 1937) (I)
=*Spaniotoma recta* Edwards, 1929
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997).

H. ruttneri Strenzke et Thienemann, 1942
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Krenosmittia*** Thienemann et Krüger, 1939

K. boreoalpina (Goetghebuer, 1944) (I)
Distribution: Muntele Mic (Albu 1966b); Retezat Mts (Negru, Viorica Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997).

K. camptophleps (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Jiu (Cheile Gârbovului) (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele, Negru Ls, Bârlii, Radeș, Zlătuia Rs) (Tatole 1994, 2003b, 2004a, 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Olt (Câineni, Muereasca Rs) (Tatole 1985, 2003b).

Genus ***Limnophyes*** Eaton, 1875

L. difficilis Brundin, 1947 (I)
Distribution: Sîngiorz (Someș), Teleorman–Tal (Albu 1966b); Retezat Mts (Negru, Gemenele, Florica, Viorica, Lia Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a).

L. eltoni (Edwards, 1921) (I+L)
Distribution: Sângeorz, Teleorman V, Sinaia, Chimogi, Frăsinet (Tatole 2003b); Retezat Mts (Gemene, Negru, Florica,Viorica, Lia Ls, Gura Zlata), (Tatole 2003b, Botnariuc and Tatole 1997); Olt (Făgăraș–Avrig, Lotru V) (Tatole 2002); Baiului Mts (Valea Roşie Br, Unghia Mică R) (Tatole 2004c).

L. gurgicola (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Borşa (Vişeuț) (Albu 1963, 1966b); Retezat Mts (Negru, Bucura, Viorica Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 2003b);) (Tatole 2002); Sinaia (Tatole 2003b).

L. jemtlandicus Brundin, 1947 (I)
Distribution: Retezat Mts (Bucura L, Zlătuia R) (Tatole 2003b, 2004c, Botnariuc and Tatole 1997).

L. minimus (Meigen, 1818) (I+L)
=*Limnophyes pusillus* Eaton, 1875
=*Limnophyes interruptus* Goetghebuer, 1938
Distribution: Bucsecs (Strobl 1896); Sebeș Mts (Bistra R, Tău) (Botnariuc 1956); Danube (Spring area at Porțile de Fier, Slobozia P, Forest Penciu Ch, Gostinu Ch, Sulina A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Budești, Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Retezat Mts (Bucura, Lia, Gemenele, Porții Ls, Bârlii, Netiș, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b,1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a, 2004c, Cogălniceanu et al. 2009); Jiu, Bistrița, Câmpia Olteniei (Boloşan) (Cure 1985); Lotru V, Mureș V (Luduș), Olt V, Prahova (Sinaia) (Tatole 2003b); Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (Spring area, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Fagăraş Mts (Breaza, Dridif, Sâmbăta, Viștea Mare, Arpașu Mare Rs), (Tatole 2004c); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009).

L. natalensis (Kieffer, 1914)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

L. pentaplastus (Kieffer, 1921) (I+L)
=*Camptocladius prolongatus* Kieffer, 1921
Distribution: Sebeș Mts (Șurianu Sp) (Botnariuc 1956); Bistrița (Izvorul Alb) (Cure 1962); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Bucura, Negru, Porții, Stânișoara Ls, Bârlii, Zlătuia, Râul Mare Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 1994, 1998, 2003b, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Danube (Plavișevița, Dinu I) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Jiu, Olt (Cure 1985); Crișul Alb (Brad), Crișul Repede (Bologa) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Bârsa Mare P) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2004).

L. pumilio (Holmgren, 1869) (I)
Distribution: Retezat Mts (Viorica, Florica Ls) (Albu 1972b).

Nomina dubia in *Limnophyes*

L. dystrophilus Chernovskii, 1949 (L)
Distribution: Sebeș Mts (Gotul Sp) (Botnariuc 1956).

L. pseudoprolongatus Botnariuc and Candea–Cure, 1954 (L)
Distribution: Danube (Cruşovița, Mraconia) (Cure 1972a); Jiu (B Dîlma Mare), Colentina (Cure 1985); Prahova (Spf Bîlbîitoare, Valea Cerbului) (Cure 1985, Preda et al. 2001, 2004).

Genus ***Mesocricotopus*** Brundin, 1956

M. thienemanni (Goetghebuer, 1940) (L)
Distribution: Porțile de Fier (Mraconia) (Cure 1971).

Genus ***Mesosmittia*** Brundin 1956

M. flexuella (Edwards 1929) (I)
Distribution: Dâmbovița–Tal, Lungulețu, Dâmbovița R at Cheile Mari ale Dâmboviței (Albu 1966b, Tatole 2003b Tatole 2007); Eșelnița (Albu and Cure 1975, Cure 1985).

Genus ***Metriocnemus*** van der Wulp, 1874

M. (Metriocnemus) albolineatus (Meigen 1818) (I+L)
=*Chironomus atratulus* Zetterstedt, 1850
Distribution: Sebeș Mts (Oașa) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistricioara, Izvorul Alb, Grințieșul Mare) (Cure 1962); Dîmbovitza–Tal (Albu 1966b); Ialomița, Motru, Prahova, Someşul Cald (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene, Zănoaga Ls) (Botnariuc

and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Olt (Olteţ, Cornetu–Danube) (Cure 1985, Tatole 2002).

M. (Metriocnemus) eurynotus (Holmgren, 1883) (I+L)
=*Metriocnemus* (*Metriocnemus*) *hygropetricus* Kieffer, 1912
Distribution: Retezat Mts (Negru, Gemene, Bucura, Porții, Zănoaga Ls, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b, 2004c, Cogălniceanu et al., 2009); Danube (Vodița, Spring area at Porțile de Fier, Mraconia, Șvinița, Mocanu I, upstream Mostiștea) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Argeș, Boboia (OE), Ialomița, Jiu, Moldova, Prahova, Trotuș, Bistrița (Izvorul Muntelui) (Cure 1985); Mureș R (Seneta) (Szitó 1995); Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (Aleșd) (Szitó and Mózes 1997); Olt (Olteț: Spring in Polovraci-Baia de Fier area, Făgăraș–Avrig) (Rogoz 1972, Tatole 2002); Piatra Craiului (Saivane Sp, Bârsa Mare, Bârsa Mare, Vlădușca Rs) (Tatole 2003a, 2004c, 2007); North Dobroudja (Alba R) (Tatole 2009).

M. (Metriocnemus) fuscipes (Meigen 1818) (I+L)
Distribution: Potcoava, Dîmbovitza–Tal, Dâmbovița R at Cheile Mari ale Dâmboviței) (Albu 1966b, Tatole 2007); Retezat Mts (Gura Zlata, Tăul dintre Brazi, 1740m: 45°23'47"N, 22°54'06"E), Galeș L (Albu 1974a, Tóth et al. 2015, Toth et al. 2017); West Jiu (Cheile Gârbovului, B Câmpușel) (Cure 1985).

***M. (Metriocnemus)* hirticolis** (Staeger, 1839) (I)
Distribution: Cotmeana, Greaca, Dâmbovnic–Tal, Teleorman–Tal (Albu 1966b); Dâmboviţa V (Albu 1966b, Tatole 2003a).

M. (Metriocnemus) picipes (Meigen 1818) (I)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata, Zlătuia R) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b, 2004c); Sinaia (Tatole 2003b).

M. (Metriocnemus) tristellus Edwards 1929 (I)
Distribution: Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c).

Genus ***Nanocladius*** Kieffer, 1913

N. (Nanocladius) balticus (Palmen, 1959) (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1968a, Tatole 2003b).

N. (Nanocladius) dichromus (Kieffer, 1906) (I+L)
=*Chironomus bicolor* Zetterstedt, 1838
Distribution: Danube Delta (Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953b); Bistrița, Bicaz DL (Izvorul Alb) (Cure 1962); Danube (Cerna, Cozla, Ada–Kaleh,

Jiu–Olt (Cure 1963,1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2003b); Crapina–Jijila, Chirnogi, Budești (Albu 1966a, 1967, Albu and Botnariuc 1966); Jiu, Casimcea, S Bugeac, S Marica (Cure 1985); Olt (Dridif, Brezii, Sâmbăta, Valea Caşilor, Neagra Rs, Avrig, Viștea, Voila, Călimănești, Muereasca, Râmnicu Vâlcea, Sălătrucel Rs, Cornetu–Danube) (Tatole et Prunescu–Arion, Tatole 1985, 1992, 1999, 2002, 2004c); Mureș (Răstolița) (Szitó 1995); Crișul Repede (upstream Odorhei, Fughiu, Stâna de Vale Tb) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj, downstream Dej) (Szitó et Mózes 1999); Someșul Mic (Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2004c, 2007); Retezat Mts (Zănoaga) (Cogălniceanu et al. 2009); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009).

N. (Nanocladius) distinctus (Malloch, 1915)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

N. (Nanocladius) rectinervis (Kieffer 1911) (L)
Distribution: Someșul Mic (Gherla) (Tudorancea et Tudorancea 2000–2001); Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009).

Genus ***Neobrillia*** Kawai, 1991

N. longistyla Kawai, 1991
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Orthocladius*** van der Wulp, 1874

O. (Eudactylocladius) fuscimanus (Kieffer, 1908) (I)
=*Orthocladius obtexens* Brundin, 1956
Distribution: Retezat Mts (Tinovul Gemene, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997).

O. (Eudactylocladius) gelidorum (Kieffer, 1923)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

O. (Eudactylocladius) olivaceus (Kieffer, 1911) (L)
Distribution: Sebeș Mts (Șurianu Sp) (Botnariuc 1956); Donau (Mraconia), Dâmbovița (Moroieni), Jiu (Apa Neagră), Motru (Cure 1985); Retezat Mts (Radeș R) (Tatole 1994); Crișul Alb (Spring Area), Crișul Negru (Ștei) (Szitó and Mózes 1997); Olt (Făgăraș–Avrig, Olteț; B Urlieș) (Cure 1971, 1985, Tatole 2002).

O. (Eudactylocladius) priomixtus Saether, 2004 (I)
=*Orthocladius* (*Eudactylocladius*) *mixtus*, (Holmgren, 1869)
Distribution: Retezat Mts (Negru L, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a).

O.* (*Euorthocladius*) *rivicola Kieffer, 1921 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a); Moldova, Jiu (Cîmpul lui Neag), Olt–Tal (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

O.* (*Euorthocladius*) *rivulorum Kieffer, 1909 (L)
Distribution: Jiu (Motru), Siret (Moldova, Bistriţa) (Cure 1962, 1985); Crişul Repede (Fughiu) (Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Fagăraş Mts (Râul Doamnei) (Cure 1985, Tatole 2004c).

O.* (*Euorthocladius*) *saxosus (Tokunaga, 1939) (L)
Distribution: Danube (Spring area at Porţile de Fier, Şvinița–Tişovița) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Olt (Olteţ, B Oltețcior), Trotuş (B Urlieş), Jiu (Petrila) (Cure 1985).

O.* (*Euorthocladius*) *thienemanni Kieffer, 1906 (I+L)
Distribution: Moldova (Baia), Someşul Cald (Dălboaca), Lotru V, Olteţ (Oltețcior, Urlieş, Nistoreşti), Porţile de Fier (Mraconia, Fetii, Cerna, Berzasca, Tisoviţa) (Cure 1971, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2003b); Argeş, Jiu (Tismana, Gilort, Motru), Ialomiţa (B Ialomicioara), Prahova, Bobaia, Gologanu (OE) (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene, Ana, Bucura, Negru, Ştirbu, Zănoaga Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Crişul Repede (Spring area, Aleşd, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Stâna de Vale, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Piatra Craiului (Padina Urşilor Br) (Tatole 2003a, 2004b, Tatole 2004c); Baiului Mts (Azuga, Unghia Mică Rs) (Tatole 2004c).

O.* (*Mesorthocladius*) *frigidus (Zetterstedt, 1838) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a); Jiu (Cure 1985).

O.* (*Orthocladius*) *clarkei Soponis, 1977 (L)
Distribution: Crişul Repede (Fughiu, Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

O. (Orthocladius) dentifer Brundin, 1947 (I)
Distribution: Sinaia (Albu, CHR coll. MGAB).

O. (Orthocladius) excavatus Brundin, 1947 (L)
=*Orthocladius obumbratus* Johansen, 1905
Distribution: Retezat Mts (Zlătuia R) (Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c).

O. (Orthocladius) nitidoscutellatus Lundström, 1915 (L)
=*Orthocladius* (*Orthocladius*) *trigonolabis* Edwards, 1924
Distribution: Retezat Mts (Galeş L) (Toth et al. 2017); Făgăraş Mts (Bâlea L: 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

O. (Orthocladius) oblidens (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Mraconia (Albu and Cure 1975); Olt (Lotru) (Cure 1985); Sinaia (Tatole 2003b).

O. (Orthocladius) oliveri Soponis, 1977 (L)
Distribution: Retezat Mts (Galeş L) (Toth et al. 2017).

O. (Orthocladius) rhyacobius Kieffer, 1911 (L)
Distribution: Östlicher Jiu (Cure 1985).

O. (Orthocladius) rubicundus (Meigen, 1818) (I+L)
=*Orthocladius* (*Orthocladius*) *saxicola* Kieffer, 1911
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle) (Botnariuc and Cândea 1953b); Sebeş Mts (Şurianu Sp) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Largu, Hangu, Buhalniţa, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Bicaz, Borcut, Borul Br, Corbul Br, Putna, Valea Seacă, Bicaz DL: Ceahlau, Bistricioara) (Cure 1962); Danube (Alibeg, Boşneag, Berzasca, Comeniţa, Cerna, Cozla, Crusoviţa, Elişeva, Liuborajdea, Mraconia, Plaviseviţa, Vodiţa Cerna), Porţile de Fier DL: Orşova, Giurgiu–Borcea A, Sulina A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Retezat Mts (Negru, Gemene Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Argrş, Bistriţa, Casimcea, Jiu, Mostiştea (Ft Frăsinet), Moldova, Mureş, Prahova, Someş, S Marica, S Victoria, Siutghiol, Bîlbîitoarea–Moor, Donaudelta (Cure 1985); Crişul Alb (Brad, Chişineu-Criş, Ineu), Crişul Negru (Ştei), Crişul Repede (Spring area, Aleşd, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Stâna de Vale Tb, Drăgan, Iad) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Someş (upstream and downstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Voila R, Făgăraş–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Padina Hotarului Br, Bârsa Mare R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); North Dobroudja (Smârdan A, Sulucului V) (Tatole 2009).

O. (Pogonocladius) consobrinus (Holmgren, 1869) (L)
Distribution: Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

O. (Symposiocladius) lignicola (Kieffer, 1914) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 2004c); Crişul Repede (Fughiu) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Paracladius*** Hirvenoja, 1973

P. alpicola (Zetterstedt, 1850) (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1968a); Retezat Mts (Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Danube (Cerna, Eşelniţa) (Albu and Cure 1975); Bistriţa (B Buhalniţa), Trotuş (Izvorul Alb), Chitila (Cure 1985); Piatra Craiului (Padina Urşilor Br, Râul Mare al Zărneştilor, Dâmboviţa R at Cheile Mari ale Dâmboviţei) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Olt, Lotru, Muntele Mic (Tatole 2003b).

P. conversus (Walker, 1856) (L)
Distribution: Jiu (Motru, Gilort), Ialomiţa, Donau (Eisernes Tor, Cerna), Bistriţa (S Vaduri) (Cure 1985); Crişul Repede (Fughiu) (Szitó and Mózes 1997), Someş (upstream Cluj, downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999).

Gernus ***Paracricotopus*** Brundin, 1956

P. niger (Kieffer 1913) (I+L)
Distribution: Sinaia, Fl Prahova (Albu 1968a, Cure 1985); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

P. uliginosus (Brundin, 1947) (I)
Distribution: Eşelniţa (Albu and Cure 1975); Sinaia, Muntele Mic (Tatole 2003b).

Genus ***Parakiefferiella*** Thienemann, 1936

P. bathophila (Kieffer, 1912) (I)
Distribution: Donau (Iron Gates), Jiu (Tismana, B Tismăniţa) (Cure 1985); Crişul Alb (Aciuţa), Crişul Negru (Ştei), Crişul Repede (Aleşd) (Szitó and Mózes 1997).

P. triquetra (Pankratova, 1970) (L)
Distribution: Jiu (Tismana, Motru, Petroşani) (Cure 1985)

Genus ***Paralimnophyes*** Brundin, 1956

P. longiseta (Thienemann, 1919) (L)
=*Camptocladius hydrophilus* Goetghebuer, 1921
Distribution: Crişul Repede (Stâna de Vale) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Parametriocnemus*** Goetghebuer 1932

P. lundbeckii (Johannsen, 1905)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

P. stylatus (Spaerck 1923) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gemenele L, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Jiu (Tismana) (Cure 1985).

Genus ***Paraphaenocladius*** Thienemann, 1924

P. impensus (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Neajlov–Tal (Albu 1966b); Retezat Mts (Bucura, Negru, Gemenele Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 2003b, Cogălniceanu et al. 2009), Cerna (Donau km 957), B Ozana (Moldova) (Cure 1985); Sinaia, Frăsinet (Tatole 2003b); Piatra Craiului (Dâmbovița R at Cheile Mari ale Dâmboviței) (Albu 1966b, Tatole 2007).

P. irritus (Walker, 1856) (I)
Distribution: Retezat Mts (Negru L) (Albu 1972b); Muntele Mic (Tatole 2003b).

P. penerasus (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Muntele Mic (Tatole 2003b).

P. pseudirritus Strenzke, 1950 (L)
Distribution: Neajlov, Casimcea (Cure 1985); Olt (Valea Cașilor, Neagra Rs) (Tatole and Prunescu–Arion 1992).

Genus ***Paratrissocladius*** Zavrel, 1937

P. excerptus (Walker, 1856) (I+L)
=*Paratrissocladius fluviatilis* Goetghebuer, 1937
Distribution: Crișul Repede (Bologa) (Szitó and Mózes 1997); Sinaia (Tatole 2003b, 2004c).

Genus ***Parorthocladius*** Thienemann, 1935

P. nudipennis (Kieffer, 1908) (I+L)
Distribution: Bistrița (Bistrița, Bistricioara) (Cure 1962); Danube (Nera, Cerna, Bahna) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Retezat Mts (Bucura, Negru, Știrbu, Zănoaga Ls, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b, 2004c, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Jiu (Cîmpul lui Neag, Petrila, Fl Tismana) (Cure 1985); Crișul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Olt V (Câineni) (Tatole 2003b).

Nomen dubium, probably, in *Parorthocladius*

P. tridentifer Linevich, 1957 (L)
Distribution: Olt (Olteț: Spring in Polovraci-Baia de Fier area) (Cure 1971, Rogoz 1972); Jiu (Cheile Gârbovului, Petrila), Trotuș, B Urlieș (Cure 1985).

Genus ***Propsilocerus*** Kieffer, 1923

P. lacustris Kieffer, 1923 (I+L)
=*Propsilocerus danubialis* Botnariuc and Albu , 1956
Distribution: Danube Delta (Roşu, Tihai, Matiţa, Tri-Ozera, Bogdaproste, Matița, Roșu, Roșuleț, Uzlina, Isacova, Țihai, Șerbănoiul Mare, Bacina) (Botnariuc and Albu 1956, Albu 1966a, Cure 1985, Tatole 1990, 2003b); Crișul Negru (Ștei) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Cald, upstream Cluj, downstream Beclean) (Szitó and Mózes 1999).

P. paradoxus (Lundström, 1915) (L)
Distribution: Barcău R: Sârg (Szitó 1997); Someș R (Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999).

Genus ***Prosmittia*** Brundin, 1956

P. jemtlandica (Brundin, 1947) (I)
Distribution: Sinaia, Fl Prahova (Albu 1968, Cure 1985).

Genus ***Psectrocladius*** Kieffer, 1908

P. (Allopsectrocladius) obvius (Walker, 1856) (L)
=*Psectrocladius dilatatus* (Van der Wulp, 1859)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle) (Botnariuc and Cândea 1953b); Danube (Nera) (Cure 1972a); Crișul Repede (Aleșd, Bologa, Fughiu, Cheresig, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Someș (Someșul Cald) (Szitó and Mózes 1999); Retezat Mts (Radeș L) (Cogălniceanu et al. 2009).

P. (Mesopsectrocladius) barbatipes Kieffer, 1923 (L)
Distribution: Făgăraș Mts (Bâlea L): 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

P. (Monopsectrocladius) calcaratus (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Retezat Mts (Lia L) (Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Tămaşului R, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, Tatole 2004b, 2004c, 2007).

P. (Psectrocladius) barbimanus (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Donaudelta (Musura, Caraorman) (Botnariuc and Cândea 1953b, Cure 1985); Sebeș Mts (Sebeș R) (Botnariuc 1956); Crișul Alb (Brad, Aciuța), Crișul Negru (Ștei), Crișul Repede (Bologa, Stâna de Vale, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Cald) (Szitó and Mózes 1999); Crapina–Jijila (Tatole 2003b).

P. (Psectrocladius) bisetus Gortghebuer, 1942 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gemenele, Ana, Lia, Negru, Porții, Radeș Ls, Zlătuia R) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009).

P. (Psectrocladius) fabricus Zelentsov, 1980
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

P. (Psectrocladius) limbatellus (Holmgren, 1869) (I)
Distribution: Crapina–Jijila (Tatole 2003b).

P. (Psectrocladius) octomaculatus Wülker, 1956 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Negru, Gemenele, Ana, Lia Ls) (Botnariuc and Albu 1971a, 1971b Albu 1972b, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Tămașului R, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

P. (Psectrocladius) psilopterus (Kieffer, 1906) (L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Tri–Ozera, Obretinul Mare, Furtuna, Puiu, Melea, Cordon) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); Bistrița (Racova, Pîngărați, Bicaz DL (Hangu) (Cure 1962, 1985); Danube (Liuborajdea, Oravița, DL Porțile de Fier: Mraconia) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Argeș, Jiu, Mureș, Prahova, S Marica (Cure 1985); Retezat Mts (Bucura, Florica, Gemenele, Lia, Negru, Zănoaga Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Barcău R (Sârg) (Szitó 1997); Someșul Mic (downstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Olt (Olteț: Spring in Polovraci-Baia de Fier area); (Făgăraș–Avrig) (Rogoz 1972; Tatole 2002); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Iezer Păpușa Mts (Brătia R) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009).

P. (Psectrocladius) simulans (Johannsen, 1937) (L)
Distribution: Ost–Jiu, Prahova (Spf Bîlbîitoarea) (Cure 1985); Crișul Repede (Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999; Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009).

P. (Psectrocladius) sordidellus (Zetterstedt, 1840) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Budești, Chirnogi (Albu 1966a, 1967, Albu and Botnariuc 1966); Donau (Iron Gates–Orșova) (Cure 1985); Retezat Mts (Ascuns, Gemenele,

Zănoaga, Tăul dintre Brazi (45°23'47"N, 22°54'06"E), Galeș Ls) (Cogălniceanu et al. 2009, Tóth et al. 2015, 2017); Cruhlic Mare, Cruhlic Mic ("Dunavăț promontory") (Giaime et al. 2018); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

Genus ***Pseudorthocladius*** Goetghebuer, 1943

P. (Pseudorthocladius) curtistylus (Goetghebuer, 1921 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gemenele, Zănoaga Negru Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Cogălniceanu et al. 2009); Tismana (B Tismănița), Sinaia, Muntele Mic.

Genus ***Pseudosmittia*** Edwards, 1932

P. angusta (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Caransebeș (Tatole 2003b).

P. danconai (Marcuzzi, 1947) (I+L)
=*Pseudosmittia hamata* Strenzke, 1960
Distribution: Budești, Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Rîul Doamnei (Argeș), Caransebeș (Timiș) (Cure 1985); Olt V (Lotru) (Tatole 2003b).

P. gracilis (Goetghebuer, 1913) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Bucura L) (Albu 1972b); Jiu (Podari), S Tomeni (Zufluß Olt–Olteț), Chirnogi, Sîngiorz, Neajlov, Topleț, Oașa (Cure 1985); Retezat Mts (Bucura L) (Botnariuc and Tatole 1997).

P. holsata Thienemann et Strenzke, 1940 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1968, Tatole 2003b); Sinaia, Olt–Tal, Lotru–Tal (Cure 1985).

P. mathildae Albu, 1968 (I)
Distribution: Caransebeș (Banat) (Albu 1968).

P. trilobata (Edwards, 1929) (I+L)
=*Smittia triappendiculata* Goetghebuer, 1931
Distribution: Sângeorz (Albu 1963, 1966a); Neajlov–Tal (Albu 1966a); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Cerna (Albu and Cure 1975); Jiu (Tismănița), Olteț (Cure 1985); Oașa; Sinaia (Tatole 2003b); Făgăraș Mts (Dridif R) (Tatole 2004c).

Genus ***Rheocricotopus*** Brundin, 1956

R. (Psilocricotopus) atripes (Kieffer, 1913) (I)
=*Spaniotoma foveatus* Edwards, 1929
Distribution: Sinaia (Albu 1968a); Retezat Mts (Gemene L, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Boşneag, Cerna, Sviniţa (Albu and Cure 1975); Chirnogi (Tatole 2003b).

R. (Psilocricotopus) chalybeatus (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Porțile de Fier, Chirnogi, Olt V (Tatole 2003b).

R. (Rheocricotopus) effusus (Walker, 1856) (I+L)
=*Orthocladius dorieri* Goetghebuer, 1932
Distribution: Sebeș Mts (Gotu Br, Sebeș R) (Botnariuc 1956); Budești (Argeș) (Albu 1966a); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Florica, Gemenele, Porții, Știrbu, Galeș Ls, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2003b, Cogălniceanu et al. 2009, Toth et al. 2017); Crișul Alb (Brad) (Szitó et Mózes, 1997); Prahova (Sinaia, Valea Cerbului) (Albu 1968a, Preda et al. 2001, 2004); Olt V (Tatole 2003b).

R. (Rheocricotopus) fuscipes (Kieffer 1909) (I+L)
=*Cricotopus dispar* Goetghebuer, 1913
Distribution: Prahova (Sinaia, Valea Cerbului) (Albu 1968a, Preda et al. 2001, 2004); Ada–Kaleh (Albu and Cure 1975); Olt–Tal (Cure 1985); Retezat Mts (Bucura, Gemenele, Negru, Știrbu, Zănoaga Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009).

Nomen dubium in *Rheocricotopus*

R. barbatus (Cândea, 1954) (L)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Borsec, Grințieșul Mare), Apuseni Mts (Disghita Br, Arieșul Mare R, Iarba Rea Sp), Repede Br (Siret near Bacău) (Cândea 1954); Danube (Cerna, Vodița, Mraconia, Șviniţa–Tișovița, Berzasca, Crușoviţa, Elișeviţa) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Argeș (Dîmbovnic, Neajlov, Valea cu Pești), Jiu (Tismana), Prahova, Olt (Olteț, Lotru), Bistrița (StS Bicaz) (Cure 1985); Iezer-Păpușa Mts (Brătia R) (Tatole 2004c).

Genus ***Rheosmittia*** Brundin, 1956

R. languida (Brundin, 1956) (I)
Distribution: Budești (Albu 1966a); Retezat Mts (Lia L) (Albu 1972b).

R. spinicornis (Brundin, 1956) (I+L)
Distribution: Muntele Mic, Oașa (Sebeș V) (Albu 1966b); Retezat Mts (Negru, Gemene Ls) (Botnariuc and Tatole 1997); Piatra Craiului (Padina Urșilor Br, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Olt V, Lotru V (Tatole 2003b).

Genus ***Smittia*** Holmgren, 1869

S. antelobata Albu,1970 (I)
Distribution: Cazanele Mici, Cerna (Șepilea), Dubova (Albu1970, Albu and Cure 1975).

S. aterrima (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1964a, 1966c, 1967); Oltenitza (Chirnogi) (Albu and Botnariuc 1966); Retezat Mts (Negru, Gemenele Ls) (Albu 1972b, Tatole 2003b); Bahna, Cerna (Albu and Cure 1975); Jiu (Livezeni) (Cure 1985); Olt (Neagra, Arpașu Mare Rs) Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole et Prunescu–Arion 1992, Tatole 1999, 2002); Someș (downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999); Prahova R (Sinaia) (Tatole 2004c).

S. betuletorum Edwards, 1941 (I)
Distribution: Vinului V, Sîngeorz, Borșa (Albu 1966b).

S. contingens (Walker, 1956) (I+L)
=*Smittia aquatilis* Goetghebuer, 1921
Distribution: Chirnogi, Baia de Arieș (Albu 1966a); StS Eisernes Tor (Bahna–Bucht), Colentina, Jiu, Baia de Aramă (Cure 1985); Olt (Făgăraș–Avrig) (Tatole 2002); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2004); Retezat Mts (Gemenele, Negru Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

S. leucopogon (Meigen, 1804) (I)
Distribution: Sângiorz (Albu, CHR coll. MGAB).

S. pratorum (Goetghebuer, 1927) (I)
Distribution: Sângiorz (Albu CHR coll. MGAB).

S. superata Goetghebuer, 1939 (I)
Distribution: Retezat Mts (Florica L, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a); Muntele Mic (Tatole 2003b).

S. terrestris (Thienemann et Strenzke, 1941) (L)
Distribution: Argeș (Valea cu Pești), Moldova (Cîmpulung), Olteț (Bobu, Topolnița, Ribari) (Cure 1971, 1985); Făgăraș Mts (Râul Doamnei) (Tatole 2004c).

S. vesparum Goetghebuer, 1921 (I)
Distribution: Sîngeorz (Albu 1966b).

Nomen dubium in Smittia

S. sedula Konstantinov, 1952 (L)
Distribution: Teslui R, Olteţ, Bobu (Cure 1971); Jiu (Motru, Tismana, Podari), Dâmbovița (Moroieni) (Cure 1985).

Genus ***Symbiocladius*** Kieffer 1925

S. rhithrogenae (Zavrel 1924) (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1966b).

Genus ***Synorthocladius*** Thienemann 1935

S. semivirens (Kieffer 1909) (I+L)
Distribution: Bistrița (Largu, Izvorul Alb) (Cure 1962); Muntele Mic (Albu 1966b); Retezat Mts (Netiș, Dobrun, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004a); Danube (Cerna, Crusoviţa, Danube, Elișeva, Plavișevița) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Argeș, Prahova (Poiana Ţapului–Predeal), Someșul Cald (B Rișca), Moldova (Păltiniș), Jiu (Sadu) (Cure 1985); Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Crișul Repede (Fughiu), (Tudorancea and Tudorancea 1998, Tudorancea 1999); Someșul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău), (Cure, 1985), Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999); Olt, Lotru (Tatole 2003b).

Genus ***Thalassosmittia*** Strenzke et Remmert 1957

T. thalassophila (Bequaert et Goetghebuer 1913) (L)
Distribution: Jiu (Dîlma Mare, Tismana), Prahova (Doftana, Vitioara), Trotuș, Moldova, Olteț (Cure 1985).

Genus ***Thienemannia*** Kieffer, 1909

T. gracei (Edwards, 1929) (I)
≡*Metriocnemus gracei* Edwards, 1929
Distribution: Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a, Cure 1985).

T. gracilis Kieffer, 1909 (I+L)
Distribution: Borșa (Vișeuţ) (Albu 1963, 1966b); Olteţ (B Ribari), Lotru (Bora Mioarei), Jiu (B Tismana) (Cure 1985); Someș (Someșul Cald, upstream Cluj, downstream Cluj, confluence Arin Br, Sângiorz Băi, Năsăud, Beclean, Dej, Odorhei, Sălsig, Pomi,

Păulești, Vetiș) (Szitó and Mózes 1999); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001; Muntele Mic (Tatole 2003b).

Genus ***Thienemanniella*** Kieffer, 1911

T. acuticornis (Kieffer, 1912) (I+L)
=*Microlenzia fusca* Kieffer, 1925
Distribution: Berzasca (Albu and Cure 1975); Jiu (Motru, Tismana), Olt (Olteț, Lotru, Teslui), Argeș (Neajlov, Colentina, Budești, Buda, Copăceni) (Cure 1985).

T. clavicornis (Kieffer 1911) (I+L)
Distribution: Borșa (Vișeuț) (Albu 1963, 1966b); Retezat Mts (Bucura, Știrbu Negru, Gemenele, Galeș Ls, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Cogălniceanu et al. 2009, Toth et al. 2017); Donau (Iron Gates), Jiu, Ialomița, Prahova, Neajlov, Colentina (Cure 1985); Mureș (Ilva, Ilva Mare Rs) (Tatole 1996); Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Tămașului R, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Muntele Mic (Tatole 2003b); Baiului Mts (Unghia Mică, Azuga Rs) (Tatole 2004c).

T. flavescens (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Crișul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997).

T. vittata (Edwards, 1924) (L)
Distribution: Crișul Repede (upstream Odorhei) (Szitó and Mózes 1997); Caransebeș (Tatole 2003b).

Nomen dubium in *Thienemanniella*

T. flaviforceps Kieffer 1925 (L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna) (Botnariuc and Cândea 1953b); Bistrița (Bistrița, Galu, Largu, Hangu, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Secu, Bicaz, Borcut, Răchițișul Mare, Borul Br, Corbul Br, Putna, Grințieșul Mare) (Cure 1962); Danube (Cerna, Cozla) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Jiu (Motru, Tismana), Ialomița (Fl Cricov), Siret (Bistrița, Moldova, Trotuș), Fl Bobaia (OE) (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene L) (Botnariuc and Tatole 1997); Fagăraș-Iezer-Păpușa Mts (Vâlsan, Brătia, Râul Doamnei Rs) (Tatole 1993c, 2004c)

T. longicornis (Kieffer, 1921)(I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Cure 1985).

Genus ***Tokunagaia*** Saether, 1973

T. rectangularis (Goetghebuer, 1940) (I)
Distribution: Retezat Mts (Negru L, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Prahova V (Sinaia) (Tatole 2003b).

Genus ***Trissocladius*** Kieffer 1908

T. brevipalpis Kieffer 1908 (L)
Distribution: Jiu (Tismana) (Cure 1985); Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

Genus ***Tvetenia*** Kieffer, 1922

T. bavarica (Goetghebuer, 1934) (L)
Distribution: Sebeș Mts (Gotul, Sebeș Brs, Gotul Sp) (Botnariuc 1956); Bistrița (Fărcașa, Galu, Hangu, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Secu, Borcut R, Borul Br, Corb Br, Putna R) (Cure 1962); Danube (Porțile de Fier DL: Orșova) (Cure 1972a); Argeș, Casimcea, Prahova (Predeal), Jiu (Tismana, Petroșani), Someșul Cald, Someșul Mic (Cure 1985); Retezat Mts (Bucura, Gemenele, Galeș Ls, Râușor, Netiș, Văgăuna Neagră, Zlătuia, Bârlii, Râul Mare Rs) (Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009, Toth et al. 2017); Piatra Craiului (Bârsa Tămașului Br, Bârsa Tămașului R, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Baiului Mts (Unghia Mică R, Azuga R confluence Unghia Mică R, confluence Unghia Mare R) (Tatole 2004c); Făgăraș Mts (Bâlea L 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

T. calvescens (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Bicaz, Corbul Br) (Cure 1962); Naipu (Albu 1966); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Gemenele, Negru, Știrbu, Viorica Ls, Zlătuia R, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Prahova (Sinaia, Predeal), Someşul Cald (Călineasa), Someşul Mic (Gilău) (Cure 1985, Tatole 2003b); Olt (Făgăraș–Avrig, Muereasca, Cornetu–Danube) (Tatole 1985, 2002).

T. duodenaria Kieffer, 1922 (L)
Distribution: Olt (Muereasca, Sălătrucel Rs) (Tatole 1985).

T. paucunca (Saether, 1969)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

T. verralli (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Tismana (Cure 1985); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului Br, Curmătura R) (Tatole 2004b, 2007); Chirnogi (Tatole 2003b).

T. tshernovskii (Pankratova, 1968) (L)
Distribution: Porțile de Fier DL (Bahna) (Cure 1972a); Bistrița, Olt, Olteț, Jiu (B Pilug, Gilort) (Cure 1985); Crișul Negru (Știei); Crișul Repede (Iad) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Zalutschia*** Lipina 1939

Z. mucronata (Brundin 1949) (L)
=*Orthocladius potamophilus* (Chernovskii, 1949)
Distribution: Bistrița (Bistricioara, Secu, Putna) (Cure 1962); Donau (Cerna, Elișeva Sulina A) (Albu and Cure 1975); Argeș, Dîmbovița, Ialomița, Olteț, Jiu (Pilug), Moldova (Cure 1985).

Nomina dubia in Orthocladiinae

Orthocladiinae *fontana* Pankratova, 1950 (L)
Distribution: Bistrița (Largu, Hangu, Buhalnița, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Bicaz, Borcut, Răchițișul Mare, Borul Br, Corbul Br, Putna, Valea Seacă, Grințieșul Mare) (Cure 1962); Coronini–Orșova (Cure 1963); Someșul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Orthocladiinae *hyalina* Pankratova, 1950 (L)
Distribution: Bistrița (Bistrița, Buhalnița, Potoci, Bicaz) (Cure 1962).

Orthocladiinae *karelica* Chernovskii, 1949 (L)
Distribution: Bistrița (Bistrița, Schit, Izvorul Alb) (Cure 1962).

Orthocladiinae *triannulata* Pankratova, 1950 (L)
Distribution: Bistricioara (Borul Br, Corbul Br, Putna, Pintec) (Cure 1962).

SUBFAMILY **CHIRONOMINAE** Newman, 1834
Tribe **Chironomini** Newman, 1834
Genus ***Axarus*** Roback, 1980

A. fungorum (Albu, 1980)
=*Xenochironomus fungorum* Albu, 1980
Distribution: In Romania, probably present (Albu 1980).

Genus ***Baeotendipes*** Kieffer, 1913

B. noctivagus (Kieffer, 1911) (I+L)
=*Halliella taurica* Chernovskii, 1949
Distribution: Techirghiol L (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

Genus ***Beckidia*** Saether, 1979

B. zabolotzky (Goetghebuer, 1938) (I+L)
=*Chironomus* (*Cryptochironomus*) *zabolotzkyi* Goetghebuer, 1938
Distribution: Danube (Coronini–Orșova, Mouth of Jiu, Albina I) (Cure 1963, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Nera, Argeș, Olt (Cure 1985).

Genus ***Benthalia*** Lipina, 1939

B. carbonaria (Meigen, 1804) (I+L)
=*Einfeldia dissidens* Walker, 1856
=*Einfeldia insolita* Kieffer, 1922
Distribution: Danube Delta (Roșu, Sf. Gheorge A) (Botnariuc and Cândea 1953b, Albu 1980, Cure 1985, Hulea and Mustață 2002); Mangalia (Albu 1980); S Marica und Victoria (Cure 1985); Crișul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008).

Genus ***Chernovskiia*** Saether, 1977

C. macrocera Saether, 1977
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

C. orbicus (Townes, 1945) (L)
Distribution: Donau (km 709, 633, 599, 494, 416) (Cure 1985).

Genus ***Chironomus*** Meigen, 1803

C. (Chironomus) alpestris Goetghebuer, 1934 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gemenele L) (Botnariuc and Albu 1971a, 1971b).

C. (Chironomus) annularius Meigen, 1818 (I+L)
Distribution: Jijila (Albu 1960b); Chirnogi, Budești (Albu 1966a); Vedea (Plapcea) (Albu 1980); Danube Delta (Letea, Cuibeda, Roșu) (Albu 1980, (Cure 1985); Spf Stegardin, Spf Bîlbîitoarea Făget (Cure 1985); Someș (Sângiorz Băi) (Szitó and Mózes 1999); North Dobroudja (Babadag, Taița Ls) (Tatole 2009).

C. (Chironomus) anthracinus Zetterstedt, 1860 (L)
=*Chironomus* (*Chironomus*) *bathophilus* Kieffer, 1931
Distribution: Danube Delta (Roşu, Cuibeda) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Danube (Mraconia, Orșova, Cama I, Slobozia Ch, Mostiștea Ch) (Cure, 1972a, Tatole 2005); Jiu, Olt, StS. Bicaz (Bistrița), S. Bîtca Doamnei (Argeș), Prahova (S. Vitioara) (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele, Zănoaga, Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E) Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et

al. 2009, Tóth et al. 2015); North Dobroudja (Sărat L.) (Tatole 2009); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

C. (Chironomus) aprilinus Meigen, 1818 (I)
=*Chironomus* (*Chironomus*) *halophilus* Kieffer, 1913
Distribution: Mangalia, Eforie Sud (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

C. (Chironomus) cingulatus Meigen, 1830 (I)
Distribution: Budeşti, Chirnogi, Porţile de Fier DL (Albu 1980).

C. (Chironomus) luridus Strenzke, 1959 (I)
Distribution: Budeşti (Albu 1966).

C. (Chironomus) nigrocaudatus Erbaeva, 1968 (L)
Distribution: Someşul Mic (Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

C. (Chironomus) pallidivittatus (Edwards, 1929) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Chirnogi, Valea Roşie (Albu 1980); Danube Delta (Hulea and Mustaţă 2002); Retezat Mts (Gemenele, Răsucit Ls) (Cogălniceanu et al. 2009); North Dobroudja (Luncavița P Babadag, Sărat Ls) (Tatole 2009).

C. (Chironomus) plumosus (Linnaeus, 1758) (I+L)
=*Chironomus* (*Chironomus*) *ferrugineovittatus* Zetterstedt, 1850
Distribution: Herculesbad, Orşova (Kowarz 1873); Azuga (Fleck 1904); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Obretinul Mic, Roşu, Furtuna, Puiu, Cordon, Cuibeda, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustaţă 2002); Sebeş Mts (Sebeş R) (Botnariuc 1956); Pasărea (Botnariuc and Popovici 1956); Crapina–Jijila (Stilnieru, Urliga) (Albu 1959, Albu 1966a); (Gura Păpădiei) (Ignat et Gruia 1973); Bistriţa (Bistriţa, Bistricioara, Izvorul Alb, Borul, Bicaz DL: Potoci, Izvorul Alb, Hangu, Ceahlau,) (Cure 1962, Cure 1967, Plăvan 2010, Plăvan et al. 2012); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube (Dubova, DL Porţile de Fier: Mraconia, Bahna, Orşova, Acalia, Pietriş, Gitanului, Mocanu Is, Giurgiu Chemical Plant Ch, downstream. Mostiştea, Mostiştea Ch, upstream Argeş, Bala, Caragheorghe, Ceacâru, Fermecatu, Fasolele, Caleia Ch, Ostrovul Lupu, Giurgiu–Borcea, Brăila, Tulcea, Mila 38) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005, Popescu et al. 2015); Greaca, Poiana Braşov L, Frăsinet, Mangalia (Albu 1980); Argeş, Criş, Ialomiţa, Jiu, Mostiştea, S Comana, Vitioara, Marica, Victoria (Cure 1985); Boascic R (Prunescu–Arion et Tatole 1986); Sărăturile L (Dobrogea) (Popescu–Marinescu and Năstăsescu 1987); Mureş (Szitó 1995); Crişul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997); Retezat Mts (Gemenele L) (Botnariuc and Tatole 1997; Someşul Mic (downstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Olt

(Avrig, Scoreiu, Viștea, Voila, Turnu, Muereasca, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Sălătrucel Rs, Cornetu–Danube, Făgăraș–Avrig) (Tatole 1985, 1999, 2002); Prahova R (Sinaia) (Tatole, 2004c); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008); Ciric R (Nicoară et al. 2009); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009).

C. (Chironomus) riparius Meigen, 1804 (I+L)
=*Tendipes thummi* Kieffer, 1911
Distribution: Herculesbad, Orsova (Kowarz 1873); Hermanstad 3Eche (Strobl 1896); Azuga (Fleck 1904); Danube Delta (Musura, Cuibeda) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Sebeș Mts (Gotu R, Sebeș R) (Botnariuc 1956); Pasărea P (Botnariuc and Popovici 1956); Danube (Coronini–Orșova, Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea, Brăila–Tulcea, Mila 38, Mouth of Jiu, Vâna I, downstream Mostiştea) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Chirnogi, Budești (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Bicaz DL (Cure 1967); Sinaia, Lotru V, Neajlov V (Albu 1980); Bistrița, Ialomița, Jiu, Mostiștea, Olt, S Victoria (Cure 1985); Mureș (Szitó 1995); Crișul Alb (Brad), Crișul Negru (Borz), Crișul Repede (upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (downstream Cluj–Napoca, Gilău, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Someș (upstream Cluj, upstream Gherla, Sângiorz Băi) (Szitó and Mózes 1999); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005); Ciric R (Nicoară et al. 2009); North Dobroudja (Luncavița P, Babadag, Sărat Ls) (Tatole 2009).

C. (Chironomus) salinarius Kieffer, 1915 (I+L)
Distribution: Danube Delta (Obretinul Mic, Puiu, Plopu, Razelm–Sinoe) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Danube (Coronini–Orșova) (Cure 1963, 1985; Mangalia–Eforie Sud (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

C. Chironomus (Chironomus) striatus Strenzke, 1959 (I)
Distribution: Retezat Mts (Gemene L) (Albu 1980).

(Chironomus) tentans Fabricius, 1805 (I+L)
=*Chironomus* (*Chironomus*) *obscurus* Meigen, 1804
Distribution: Herculesbad, Orșova (Kowarz 1873); Crișul Repede (upstream Odorhei) (Szitó and Mózes 1997); Danube Delta (Hulea and Mustață 2002).

C. (Chironomus) venustus Pinder, 1978 (I)
=*Chironomus venustus* (Wiedemann, 1828)
Distribution: Herculesbad, Orșova area (Kowarz 1873).

C.* (*Lobochironomus*) *dorsalis Meigen, 1818 (I+L)
Distribution: Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Poiana Stampei swamp (Albu 1980); Prahova (Spf Stegardin) (Cure 1985); Fagăraş Mts (Dridif, Sâmbăta, Arpaşu Mare Rs) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Smârdan A, Taiţa L) (Tatole 2009); Retezat Mts (Agăţat, Gemenele) (Cogălniceanu et al. 2009).

C. (Lobochironomus) palaearcticus (Ashe, 1990) (I)
=*Chironomus* (*Lobochironomus*) *dilatatus* Goetghebuer, 1928
Distribution: Eşelniţa (Albu 1980).

Nomen dubium in *Chironomus*

C. sordidatus Kieffer, 1913 (I)
Distribution: Jijila (Garvăn) (Albu 1960b).

Genus ***Cladopelma*** Kieffer, 1921

C. edwardsi (Kruseman, 1933) (I)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1980).

C. goetghebueri Spies et Saether, 2004 (I+L)
=*Cryptocladopelma lateralis* (Goetghebuer, 1934)
Distribution: Parîng Mts (Gâlcescu L), Retezat Mts (Gemene, Negru, Răsucit, Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E Ls, Netiş R) (Albu 1980, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Tóth et al. 2015); Argeş, Ialomiţa, Jiu, Mostiştea, Olt, Prahova, Siret, Bistriţa (Cure 1985); Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Danube (Gitanului I) (Tatole 2005).

C. virescens (Meigen, 1818) (I+L)
=*Harnischia fittkaui* Albu, 1960
=*Cryptocladopelma virescens* (Meigen, 1818)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1960a, 1966a, 1967b); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a Albu and Botnariuc 1966); Danube Delta (Maliuc), Mangalia, Snagov (Albu 1980); Ft Frăsinet (Mostiştea) (Cure 1985); Capul Midia– Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

C. viridula (Linnaeus, 1767) (I+L)
Distribution: Tăbăcăria L, Danube Delta (Obretinul Mare) (Botnariuc and Cândea 1953a, Hulea and Mustaţă 2002); Jijila (Garvăn) (Albu 1960b); Porţile de Fier DL (Mraconia, Orşova) (Cure, 1972a); Frăsinet (Albu 1980); S Victoria, Sumpf Făget Fl. Ialomiţa (Cure 1985); Sărăturile L (Dobrogea) (Popescu–Marinescu et Năstăsescu 1987); Olt (Viştea, Voila, Muereasca, Sălătrucel) (Cornetu–Danube) (Tatole 1985,

1999, 2002); Retezat Mts (Bucura, Gemenele, Negru, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009); Bratia R (upper Basin) (Truţă et al. 2017).

Nomina dubia in *Cladopelma*

C. armeniaca (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Iron Gates, Sf. Gheorghe–A, Argeș, Bistrița, Ialomița, Jiu, Moldova, Olt, Sebeș (Gotul Br) (Cure 1962, 1985).

C. fridmanae (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Babadag L. (Cândea 1954); Danube (Nera) (Albina I) (Cure 1972a, Tatole 2005).

C. laccophila Kieffer, 1922 (L)
Distribution: Danube Delta (Szitó 1994); Crișul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Cryptochironomus*** Kieffer, 1918

C. (Cryptochironomus) albofasciatus (Staeger 1839) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b, 1980); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, 1980, Albu and Botnariuc 1966); North Dobroudja (Alba R, Babadag L) (Tatole 2009).

C. (Cryptochironomus) defectus (Kieffer 1913) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Obretinul Mic, Obretinul Mare, Roșuleţ, Roșu, Furtuna, Puiu, Melea, Cordon, Cuibeda) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Hulea and Mustață 2002); București (Damian et Botoșăneanu 1954); Sebeș Mts (Db Sebeș R) (Botnariuc 1956); Bistrița (Galu, Izvorul Alb) Bicaz DL (Bistricioara–Călugăreni, Hangu, Izvorul Alb, Bâtca Baicului, Secu, Ruginești, Potoci Bay: N 46°57'57", 26°06'30"E) (Cure 1962, 1967, Dascălu et al. 2009, Plăvan 2007, 2010, Plăvan et al. 2012); Danube (Coronini–Orșova, Jiu–Olt (Dinu, Cama, Vâna I, Mostiștea Ch, upstream Mostiștea, upstream Argeș, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A, Sf. Gheorghe A, Chilia A right bank,) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975,Tatole 2005); Crișul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Vișstea Mare R, Turnu, Muereasca, Călimănești, Râmnicu Vâlcea, Sălătrucel) (Tatole 1985, 1999, 2002, 2004c); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009).

C. (Cryptochironomus) redekei (Kruseman, 1933) (L)
Distribution: Mureș (Răstolița, Gura Arieș) (Szitó 1995); Barcău (Boghiș, Suplacu, Sântimreu) (Szitó 1997); Crișul Alb (Brad, Aciuța, Ineu), Crișul Negru (Borz, Zerind), Crișul Repede (Aleșd, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig)

(Szitó and Mózes 1997); Someș (downstream Năsăud, downstream Dej, Păulești) (Szitó and Mózes 1999).

C.* (*Cryptochironomus*) *rostratus Kieffer 1921 (I)
Distribution: Sângeorz–Băi (Albu 1963, 1980); Budești, Luduș, Stlibăț (Albu 1980).

C. (Cryptochironomus) supplicans (Meigen, 1830) (I)
Distribution: Garvăn, Jijila, Urliga (Albu 1960b).

Nomen dubium, probably, in *Cryptochironomus*

C. psammophila Botnariuc and Cure, 1956 (L)
Distribution: Bistrița (Hangu, Schit, Izvorul Muntelui) (Cure 1962); Danube (Nera, Mraconia, Sf Gheorghe A (Cure 1972a, 1980); Argeș, Ialomița, Jiu, Moldova, Olt, Sebeș (B Gotul) (Cure 1985).

Genus ***Cryptotendipes*** Beck et Beck, 1969

C. holsatus Lenz, 1959 (L)
Distribution: Crișul Repede (Fughiu) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (Someșul Cald, Someșul Rece, upstream and downstream Cluj, upstream Gherla, confluence Arin Br, Sângiorz Băi, downstream Năsăud, downstream Beclean, downstream Dej, Someș Odorhei, Sălsig, Pomi, Păulești, Vetiș) (Szitó and Mózes 1999).

C. nigronitens (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b).

C. usmaënsis (Pagast, 1931) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1980); Someșul Mic (Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Demeijerea*** Kruseman, 1933

D. rufipes (Linnaeus, 1761) (L)
Distribution: Danube (Mouth of Jiu, Vâna I) (Tatole 2005).

Genus ***Demicryptochironomus*** Lenz, 1941

D.* (*Demicryptochironomus*) *vulneratus (Zetterstedt, 1838) (I+L)
Distribution: Bistrița (Bistrița) (Cure 1962); Danube (Nera, Liuborajdea, Mouth of Jiu, Mostiștea Ch, downstream Mostiștea, Giurgiu–Borcea A, Sulina, Sf Gheorghe As) (Cure 1963, 1972a, 1980, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Argeș, Jiu, S Marica,

S Victoria (Cure 1985); Crișul Negru (Poiana), Crișul Repede (Bologa) (Szitó and Mózes 1997); North Dobroudja (Pojârâta Br, Taița L) (Tatole 2009).

Genus ***Dicrotendipes*** Kieffer 1913

D. fusconotatus (Kieffer, 1922) (I)
Distribution: Mangalia–Eforie Sud (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008).

D. lobiger (Kieffer, 1921)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

D. nervosus (Staeger 1839) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Tri–Ozera, Sahaua Ledeancei, Cordon, Cuibeda) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Crapina–Jijila (Albu 1959, 1966a, 1967b, 1980); Bicaz DL (Potoci Ceahlău, Izvorul Alb, Bâtca Baicului–upstream Secu, Izvoru Muntelui Bicaz L: 46°57'27"N, 26°04'39"E; 46°57'36"N, 26°06'33"E, Potoci Bay: 46°57'57"N, 26°06'30"E) (Cure 1962, 1972a, Dascălu et al. 2009, Plăvan 2010, Plăvan et al. 2012); Budești, Greaca–See, Potcoava, Dîmbovnic–Tal (Albu 1966a); Danube (Porțile de Fier DL: Bahna, Cerna, Mraconia) (Eșelnița, Svinița) (Mahâru Pump Station, Dinu I, km 502, Sulina A) (Cure 1963, 1967, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Poiana Brașov, Iernut, Luduș (Albu 1980); Argeș, Ialomița, Prahova–Tal (Cure 1985); Mureș R (Gheja) (Szitó 1995); Crișul Negru (Borz); Crișul Repede (upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig) (Szitó and Mózes 1997); Someșul Mic downstream Cluj–Napoca, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare P, Padina Urșilor Br, Curmătura R) (Tatole 2003a, Tatole 2004a, 2004b, 2007); Baiului Mts (Unghia Mică, Azuga Rs (Tatole 2004c); North Dobroudja (Luncavița P) (Tatole 2009); Cefa Nature Park (Ateaș) (Pavelescu 2012); Cruhlic Mare, Cruhlic Mic ("Dunavăț promontory") (Giaime et al. 2018); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

D. notatus (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Crișul Repede (downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someșul Mic (Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Cruhlic Mare, Cruhlic Mic ("Dunavăț promontory") (Giaime et al. 2018).

D. pulsus (Walker, 1856) (L)
Distribution: Delta Dunării (Szitó 1994); Mureș (Gheja) (Szitó 1995).

D. tritomus (Kieffer, 1916) (L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Obretinul Mare, Obretinul Mic, Orechovo, Lopatna Ch, Musura, Cuibeda, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Hulea and Mustață 2002); Bistrița (Bistrița, Bicaz DL:

Potoci, Izvorul Alb Hangu) (Cure 1962, 1967); Argeș, Casimcea, Mureș, Ft Frăsinet, S Marica, Victoria, Gălățui, Prahova–Tal (Cure 1985); Crișul Alb (Ineu); Crișul Repede (upstream Odorhei, Cheresig) (Szitó and Mózes 1997); Baiului Mts (Unghia Mică R) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Smârdan A, Pojărâta Br, Luncavița P, Taița L) (Tatole 2009); Cefa Nature Park (Ateaș) (Pavelescu 2012).

Nomen dubium in *Dicrotendipes*

D. dubia (Cure, 1973) (L)
Distribution: Danube (Cozla, Cerna, Porțile de Fier DL: Mraconia) (Cure 1972a); Ialomița (Cheile Tătarului), Lotru (Quellengebiet), Moldova, Someșul Mic (Cure 1985).

Genus ***Einfeldia*** Kieffer, 1924

E. pagana (Meigen, 1838) (I+L)
=*Chironomus biappendiculatus* Kruglova, 1940
Distribution: Danube Delta (Isacova, K Iacubova), Donau (Eisernes Tor, Albina I) (Albu 1980, Cure 1985, Hulea and Mustață 2002, Tatole 2005); Ialomița (Vlăsia), Frăsinet, Făget, S Marica und Victoria) (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009); North Dobroudja (Telincea L) (Tatole 2009); Cefa Nature Park (Ateaș) (Pavelescu 2012).

E. pectoralis Kieffer, 1924 (L)
Distribution: Danube Delta (Chilia) (Szitó 1994, Hulea and Mustață 2002); Mureș (Szitó 1995); Crișul Alb (Brad); Crișul Repede (downstream Ciucea) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Endochironomus*** Kieffer 1918

E. albipennis (Meigen, 1830) (I+L)
=*Endochironomus miki* (Kieffer, 1915)
Distribution: Sinaia (Albu 1980); Danube Delta (Hulea and Mustață 2002).

E. tendens (Fabricius, 1775) (I+L)
=*Endochironomus alismatis* (Kieffer, 1915)
Distribution: Danube Delta (Gârla Lopatna, Sahaua Ledeancei, Letea) (Botnariuc and Cândea 1953b, Albu, 1980, Szitó 1994, Hulea and Mustață 2002); Danube (Eșelnița, Acalia I, Mostiștea Ch, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963, Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b, Albu and Botnariuc 1966); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Greaca P, Poiana Brașov, Sâmbăta de Sus, Cumpăna, Mangalia (Albu 1980); Jiu, S Marica, Gălățui, Bugeag (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele L) (Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 2004c, Cogălniceanu et

al. 2009); Someș (downstream Năsăud) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Făgăraș–Avrig) (Tatole 2002); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008); North Dobroudja (Sărat L) (Tatole 2009).

Nomen dubium in *Endochironomus*

E. signaticornis (Kieffer, 1913) (L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Obretinul Mic, Sahaua Ledeancei, Sahaua Văcarului, Lopatna, Sahalin I) (Botnariuc et Cândea, 1953b, Cure 1985).

Genus ***Fleuria*** Kieffer, 1924

F. lacustris Kieffer, 1924 (L)
Distribution: Danube Delta (Szitó 1994, Hulea and Mustață 2002).

Genus ***Glyptotendipes*** Kieffer, 1913

G. (Caulochironomus) caulicola (Kieffer, 1913) (L)
Distribution: Danube Delta (Botnariuc and Cure 1999).

G. (Caulochironomus) foliicola Contreras–Lichtenberg, 1997
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013.

G. (Caulochironomus) imbecilis (Walker, 1856) (I)
=*Glyptotendipes severini* Goetghebuer, 1923
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1959, 1980); Letea, Mangalia (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008).

G. (Caulochironomus) scirpi (Kieffer, 1915) (L)
Distribution: Donau Delta (B Jacubova), Prahova (Brazi, B Peleș), Jiu (B Câmpușel, Tismana), Motru (Apa Neagră) S Victoria (Cure 1985).

G. (Caulochironomus) viridis (Macquart, 1834 (I+L)
Distribution: Danube Delta (Chilia A, Isacova) (Albu 1980, Cure 1985).

G. (Glyptotendipes) barbipes (Staeger, 1839) (I+L)
Distribution: Mangalia (Albu 1980); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005); Danube (Albina I) (Tatole 2005); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008); North Dobroudja (Sărat L) (Tatole 2009); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

G. (Glyptotendipes) cauliginellus (Kieffer, 1913) (I+L)
=*Glyptotendipes gripekoveni* Kieffer, 1913
Distribution: Danube Delta (Gârla Lopatna, Musura, Sahaua Văcarului, Letea, Meleaua Sacalin near Sf. Gheorghe A) (Botnariuc and Cândea 1953b, Albu 1980, Tatole 1983, Szitó 1994, Hulea and Mustață 2002); Danube (Mahâru Pump Station, Acalia, Gitanului, Cărăbulea Is, Canal Giurgiu Chemical Plant, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A) (Cure 1963, Tatole 2005); Crapina–Jijila (Albu 1959, 1966a, 1967b,1980); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Argeș, Casimcea, Moldova, Ft Frăsinet, S Marica, Gălățui, Tașaul, Prahova–Tal (Cure 1985); Crișul Repede (Aleșd) (Szitó and Mózes 1997); Olt (Scoreiu, Turnu, Muereasca, Călinănești, Sălătrucel Rs, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1985, 1999, 2002); Baiului Mts (Unghia Mică R) (Tatole, 2004c); North Dobroudja (Luncavița P) (Tatole 2009).

G. (Glyptotendipes) glaucus (Meigen, 1818)
Distribution: In Romania, probably present (Botnariuc and Cure 1999).

(Glyptotendipes) pallens (Meigen, 1804) (I+L)
=*Glyptotendipes polytomus* Kieffer, 1909
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Musura) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Danube (Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Chirnogi (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Ciuperceni (Albu 1980); Olteț (Balș), Ft Frăsinet, Colentina (Ft Chitila) (Cure 1985); Crişul Repede (downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Cruhlic Mare, Cruhlic Mic ("Dunavăț promontory") (Giaime et al. 2018).

Genus ***Harnischia*** Kieffer, 1921

H. angularis Albu and Botnariuc 1966 (I)
Distribution: Chirnogi, Budești (Albu 1966a, Albu and Botnariuc, 1966); Șvinița (Albu and Cure 1975); Luduș, Știrbăț (Albu 1980).

H. curtilamellata (Malloch 1915) (I+L)
=*Harnischia pseudosimplex* Goetghebuer, 1923
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a,1967b, 1980); Șvinița (Albu and Cure 1975); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009).

H. fuscimanus Kieffer 1921 (I+L)
Distribution: Chirnogi, Budești (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube (Cerna: Topleț, Borcea A, Brăila, Sf. Gheorghe A) (Albu and Cure 1975); Iza V (Albu 1980); Jiu, Argeș, Colentina, Siret, Mureș, B Bîtca Doamnei, Vaduri (Cure 1985); Olt (Dridif, Vișlea Mare Rs, Făgăraș–Avrig) (Tatole 2002, 2004c); Izvorul Muntelui Bicaz DL (Buhalnița, Hangu, Secu, Bistricioara, Ceahlău, Tașca: 46°57'27"N, 26°04'39"E,

46°57'36"N, 26°06'33"E, Potoci Bay: 46°57'57"N, 26°06'30"E (Dascălu et al. 2009, Plăvan 2010, Plăvan et al. 2012); North Dobroudja (Taița L) (Tatole 2009),

Nomen dubium in *Harnischia*

H. burganadzeae (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Danube Delta (Iacubova, Pardina, Siriasa–Șontea) (Cândea 1954, Hulea and Mustață 2002); Danube (Coronini–Orșova, Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea A, Sulina, Sf. Gheorghe As (Cure 1963, Albu and Cure 1975); Sărăturile L (Dobrogea) (Popescu–Marinescu et Năstăsescu, 1987).

Genus ***Kiefferulus*** Goetghebuer, 1922

K.* (*Kiefferulus*) *tendipediformis (Goetghebuer, 1921) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b, 1980); Cernica (Albu 1980); Crișul Repede (upstream Odorhei) (Szitó and Mózes 1997); North Dobroudja (Babadag L, Taița L) (Tatole 2009).

Genus ***Kloosia*** Kruseman, 1933

K. pusilla (L., 1767) (I)
Distribution: Budești (Albu 1966a, 1980).

Genus ***Lauterborniella*** Thienemann et Bause, 1913

L. agrayloides (Kieffer, 1911) (L)
Distribution: Argeș, Bistrița, Casimcea, Mureș, Ft Frăsinet, Marica L Victoria L, Gălățui, Prahova–Tal (Cure 1985); Piatra Craiului (Padina Urșilor Br, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2007); Danube (Cama I) (Tatole 2005); North Dobroudja (Pojărâta Br) (Tatole 2009).

Genus ***Lipiniella*** Shilova, 1961

L. moderata Kalugina, 1970
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Microchironomus*** Kieffer, 1918

M. deribae (Freeman, 1957) (I)
Distribution: Mitreni (Albu and Ciubuc 1972, Albu 1980).

M. tener (Kieffer, 1918) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1959, 1966a, 1967b); Chirnogi, Budești (Albu 1959, 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube Delta (Maliuc, Razelm L), Mitreni, Mangalia, 2 Mai, Siretului V (Albu 1980); Argeș, Ft Frăsinet (Cure 1985); Crişul Repede (Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Olt (Făgăraș–Avrig) (Tatole 2002); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008); Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009); North Dobroudja (Babadag, Taița L) (Tatole 2009); Izvorul Muntelui Bicaz L (Hangu) (Plăvan 2010).

Nomen dubium, probably, in Microchironomus

M. conjugens (Lenz, 1926) (L)
Distribution: Porțile de Fier DL (Orșova) (Cure 1972a); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005).

Genus ***Microtendipes*** Kieffer, 1915

M. chloris (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Danube (Coronini–Orșova, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963); Alibeg, Vărădia (Albu and Cure 1975); Bistrița, (B Farcașa), Argeș (Dîmbovnic) (Cure 1962, 1985); Mureș (Răstolița) (Szitó 1995); Barcău (Boghiș) (Szitó 1997); Crișul Alb (Aciuța, Ineu); Crișul Negru (Tinca); Crișul Repede (downstream Ciucea, Fughiu, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999).

M. pedellus (De Geer, 1776) (L)
Distribution: Crișul Negru (Tinca) (Szitó and Mózes 1997); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Cefa Nature Park (Ateaș) (Pavelescu 2012); Retezat Mts (Tăul dintre Brazi, Galeș Ls) (Tóth et al. 2015, Toth et al. 2017); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

M. rydalensis (Edwards, 1929) (L)
Distribution: Crişul Repede (Drăgan) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

M. tarsalis (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Bistrița (Bistrița) (Cure 1962); Negrișoara–Tal, Potcoava, Titu (Albu 1966b, 1980); Danube (Nera, Sulina A) (Cure 1972a, 1985); Jiu (Filiași) (Cure 1985); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Bârsa Mare R, Râul Mare al Zărneștilor) (Tatole 2003a, 2004b, 2007).

Genus ***Nilomyia*** Kieffer, 1921

N. aculeata Kieffer, 1921
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013.

Genus ***Pagastiella*** Brundin, 1949

P. orophila (Edwards, 1929) (L)
=*Polypedilum minutum* Romaniszyn, 1958
Distribution: Danube Delta (Szitó 1994); Crişul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Parachironomus*** Lenz, 1921

P. cinctellus (Goetghebuer, 1921) (I)
Distribution: Budeşti, Crapina–Jijila, Danube Delta (Maliuc) (Albu 1980).

P. frequens (Johanson, 1905) (I)
=*Cryptochironomus longiforceps* Kieffer, 1921
Distribution: Danube Delta (Japşa Ascunsu, Maliuc, Letea) (Albu 1960b,1980); Budeşti, Crapina–Jijila (Albu 1960b, 1966a, 1967b, 1980).

P. gracilior (Kieffer, 1918) (I+L)
=*Parachironomus arcuatus* (Goetghebuer, 1919)
Distribution: Crapina–Jijila, Urliga (Albu 1959, 1966a, 1967b); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube Delta (Maliuc, Letea, C.A.Rosetti), Taşaul L, Luduş, Frăsinet, Caracal (Albu 1980); Argeş, Casimcea, Mureş, Olt, Siret, S Marica, Victoria, Bugeac, Gălăţui, Bicaz, Sts Eisernes Tor, Gemenele L (Cure 1985); Crişul Alb (Brad) Crişul Repede (Fughiu) (Szitó and Mózes 1997); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008); North Dobroudja (Smârdan A, Taiţa L) (Tatole 2009).

P. monochromus (van der Wulp, 1874) (I)
Distribution: Budeşti (Albu 1966a); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Maliuc, Letea, Snagov (Albu 1980).

P. parilis (Walker, 1856) (I)
Distribution: Oltenița (Chirnogi) (Albu and Botnariuc 1966); Crapina–Jijila (Ghecet–Isaccea) (Albu 1967b); Danube Delta (Maliuc, Letea), Poiana Braşov (Albu 1980).

P. varus (Goetghebuer, 1921) (L)
Distribution: Danube Delta (Hulea and Mustaţă 2002).

P. vitiosus (Goetghebuer, 1921) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Maliuc, Fortuna, Isacova) (Albu 1980); North Dobroudja (Smârdan A, Babadag, Taița Ls) (Tatole 2009).

Nomen dubium in *Parachironomus*

P. pararostratus (Harnisch, 1923) (L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Tri–Ozera, Obretinul Mare, Obretinul Mic, Sahaua Ledeancei, Furtuna, Puiu, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Bicaz DL (Izvorul Alb, Hangu, Ceahlau) (Cure 1962); Danube (Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea–A, Mila 38, Sulina A, Meleaua Sacalin) (Cure 1963, 1972a, Tatole 1983); S Bugeac, Gălățui, Tașaul, StS Bicaz (Cure 1985); Olt (Făgăraș–Avrig, Călimănești, Turnu) (Tatole 1999, 2002).

Genus ***Paracladopelma*** Harnisch 1923

P. camptolabis (Kieffer 1913) (I+L)
Distribution: Bistrița (Bicaz DL, Izvorul Alb, Potoci, Bistricioara: Borul, Corbul Brs) (Cure 1962); Budești (Albu 1966a); Danube (Cerna, Sf. Gheorghe A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Olt (Cibin), (Cure 1985); Mureș (Alba Iulia) (Szitó 1995); Crișul Negru (Tinca), Crișul Repede (Aleșd, upstream Odorhei, Cheresig, Stâna de Vale) (Szitó and Mózes 1997); Someș (Someșul Rece) (Szitó and Mózes 1999); North Dobroudja (Babadag, Taița Ls) (Tatole 2009).

P. laminatum (Kieffer 1921) (I)
Distribution: Potcoava (Albu 1980).

P. mikianum (Goetghebuer 1937) (I)
=*Cryptochironomus miki* Goetghebuer, 1932
Distribution: Sinaia Albu 1980).

P. nais (Townes, 1945) (L)
Distribution: Crișul Repede (Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

Nomen dubium in *Paracladopelma*

P. rolli (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Argeș (Malul Spart) (Cure 1985); Danube Delta (Sf. Gheorghe A, Matița, Musura) (Cure, 1985, Szitó 1994); Crișul Repede (Cheresig) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Paralauterborniella*** Lenz, 1941

P. nigrohalteralis (Malloch, 1915) (I+L)
=*Paralauterborniella brachylabis* (Edwards, 1929)
Distribution: Crapina–Jijila, Jijila–Urliga (Ghecet–Isaccea) (Albu 1960b, 1967b); Crișul Alb (Aciuța); Crișul Negru (Ștei, Borz, Tinca, Zerind) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Paratendipes*** Kieffer, 1911

P. albimanus (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Sebeș Mts (Db Sebeș R) (Botnariuc 1956); Bistrița (Bistricioara, Izvorul Muntelui Bicaz L: Ceahlău) (Cure 1962, Plăvan 2010); Danube (Nera, Mraconia, Giurgiu–Borcea–A, Sulina–A) (Cure 1963, 1972a); Neajlov V (Albu 1980); Moldova (Ozana) (Cure 1985); Crișul Repede (Fughiu, Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someșul Mic (Gilău, Apahida, Gherla) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); North Dobroudja (Babadag, Taița Ls) (Tatole 2009).

P. nubilus (Meigen, 1830 (I)
Distribution: Budești (Albu 1966, 1980).

P. nudisquama (Edwards, 1929) (I+L)
=*Paratendipes transcaucasicus* Chernovskii, 1949
Distribution: Giurgiu–Borcea (Cure 1963); Neajlov–Tal (Albu 1966b); Sinaia, Bușteni, Sîmbăta de Sus, Știrbăț (Albu 1980); Donaudelta (Iacubova), Jiu (Motru Apa Neagră, B Petroșeni, Olteț (Alunu), Argeș (Copăceni, 30 Decembrie), Colentina, Mureș (Luduș) (Cure 1985); Crișul Repede (downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998).

P. plebeius (Meigen, 1818) (L)
Distribution: Bistrița R (Schit) (Cure 1962); Danube (Porțile de Fier DL: Bahna, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea, Mila 38, Sulina A and Sf. Gheorghe A) (Cure 1963, 1972a).

P. sinelobus Albu, 1980 (I)
Distribution: Neajlov V between Corbii Mari and Izvoru (Albu 1980).

P. subaequalis (Malloch, 1915)
Distribution: In Romania, doubtfully present (Spies and Saether 2013).

Nomen dubium in *Paratendipes*

P. intermedius (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Danube (Corabia, Podari, Malul Mare) (Cure 1971, 1985); Crişul Repede (downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Phaenopsectra*** Kieffer 1921

P. flavipes (Meigen 1818) (I+L)
Distribution: Someş, Sîngiorz–Băi,Vatra Dornei (Albu 1980); Crişul Repede (upstream Odorhei, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

P. punctipes (Wiedemann 1817) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Urliga Văcăreni, Grindul Berbecilor) (Albu 1960b, 1967b, 1966a); Greaca–See, Comana (Albu 1966a); Oltenitza (Chirnogi) (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube (Eşelniţa, Dinu, Cama, Pietriş Is, Km 502, Slobozia Ch, Penciu Forest Ch, Gostinu Ch, Mostiştea Ch) (Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Danube Delta (Letea, Obretin) (Albu 1980); Fagăraş Mts (Sâmbăta R) (Tatole 2004c); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009).

Genus ***Polypedilum*** Kieffer 1912

P. (Pentapedilum) exsectum (Kieffer 1916) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Ghiolul Orechovo, Sahaua Ledeancei, Sahaua Văcarului, Lopatna Ch, Sulina A, Meleaua Sacalin near Sf. Gheorghe A) Botnariuc and Cândea 1953a,b, Tatole 1983, Hulea and Mustaţă 2002); Văcăreni, Urliga (Albu 1959); (Cure 1963); Bicaz DL (Izvorul Alb) (Cure 1967); Bahna (Albu and Cure 1975);) Jiu, Bistriţa (B Pîngăraţi), SpF Bîlbîitoarea (Cure 1985); Retezat Mts (Gemene, Ascuns Ls) (Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanuet al. 2009); Crişul Repede (Drăgan R) (Tudorancea and Tudorancea 1998); North Dobroudja (Smârdan A, Taiţa L) (Tatole 2009).

P. (Pentapedilum) sordens (van der Wulp 1875) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1967b); Eşelniţa (Albu and Cure 1975); Crişul Alb (Brad), Crişul Negru (Poiana, Ştei), Crişul Repede (downstream Ciucea, Stâna de Vale, Drăgan, Iad, Zârna) (Szitó and Mózes 1997); Danube Delta (Hulea and Mustaţă 2002); North Dobroudja (Taiţa L) (Tatole 2009).

P. (Pentapedilum) tritum (Walker 1856) (I)
Distribution: Eşelniţa (Albu and Cure 1975); Sinaia, Poiana Braşov (Albu 1980).

P. (Pentapedilum) uncinatum (Goetghebuer, 1921) (I)
Distribution: Sinaia, Poiana Brasov (Albu 1968).

P. (Polypedilum) albicorne (Meigen 1838) (I+L)
Distribution: Vinului V, Vişeul de Sus (Albu 1963); Retezat Mts (Gura Zlata, Zlătuia R) (Albu1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Sinaia, Vatra Dornei, Luduş (Albu 1980); Bratia (upper Basin) (Truţă et al. 2017).

P. (Polypedilum) amoenum Goetghebuer 1930 (I)
Distribution: Frăsinet (Albu 1980).

P. (Polypedilum) intermedium Albu and Botnariuc 1966 (I)
Distribution: Chirnogi, Budeşti (Albu 1966a, 1980); Crapina–Jijila (Albu 1966a 1967b); Sviniţa (Albu and Cure 1975); Maliuc, Porțile de Fier, Știrbăț (Albu 1980).

P. (Polypedilum) laetum (Meigen 1818 (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1968); Retezat Mts (Bârlii Br, Văgăuna Neagră, Netiș Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, Botnariuc and Tatole 1997); Barcău (Sârg) (Szitó 1997); Someș (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Bratia (upper Basin) (Truţă et al. 2017).

P. (Polypedilum) nubeculosum (Meigen 1804) (I+L)
Distribution: Herculesbad, Orșova (Kowarz 1873); Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Obretinul Mic, Obretinul Mare, Furtuna, Cordon, Cuibeda, Sahaua Văcarului) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Hulea and Mustață 2002); Bistrița (Izvoru Muntelui Bicaz Lake: Izvorul Alb, Hangu, Ceahlau, Bistricioara, Ruginești, Buhalnița, Secu, Taşca: 46°57'27"N, 26°04'39"E, 46°57'36"N, 26°06'33"E, Potoci Bay: 46°57'57"N, 26°06'30"E) (Cure 1962, 1967, Dascălu et al. 2009, Plăvan 2007, 2010, Plăvan et al. 2012); Danube (Porțile de Fier DL: Mraconia, Bahna, Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea A, Meleaua Sacalin near Sf. Gheorghe A) (Cure 1963, 1972a, Tatole 1983); Budești (Albu 1966a); Crapina–Jijila (Albu 1966a, 1967b); Mangalia, Frăsinet, Poiana Brașov (Albu 1980); Olt, S Bicaz, Bîtca Doamnei, Pîngărați, Marica (Cure 1985); Retezat Mts (Bârlii, Netiș, Văgăuna Neagră Rs, Tăul dintre Brazi L: 45°23'47"N, 22°54'06"E) (Tatole 1994, Tóth et al. 2015); Mureș (Ungheni) (Szitó 1995); Barcău (Sârg) (Szitó 1997); Crișul Alb (Brad); Crișul Negru (Poiana, Ștei); Crișul Repede (Aleșd, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Drăgan, Iad) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someşul Mic (downstream Cluj–Napoca, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008); North Dobroudja (Sărat L) (Tatole 2009); Cefa Nature Park (Ateaş) (Pavelescu 2012); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

P. (Polypedilum) nubifer (Skuse 1889) (L)
=*Polypedilum* (*Polypedilum*) *aberrans* Chernovskii, 1949
Distribution: Chirnogi, Mangalia (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube (Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963); S Victoria, Ft Colentina (Chitila) (Cure 1985); Crişul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (Gilău, Apahida, Gherla) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

P. (Polypedilum) pedestre (Meigen 1830) (I+L)
Distribution: Sebeş Mts (Bistra Tb at Tău, Sebeş Br, Sebeş Db) (Botnariuc 1956); Sinaia, Poiana Braşov (Albu 1980); Donaudelta (S Orehovo) (Cure 1985, Hulea and Mustaţă 2002); Fagăraş Mts (Sâmbăta R), Baiului Mts (Retevoi Br, Azuga R confluence Valea Roşie R, confluence Unghia Mică R) (Tatole, 2004c); North Dobroudja (Smârdan A, Babadag, Taiţa Ls) (Tatole 2009).

P. (Tripodura) acifer Townes 1945 (I)
Distribution: Neajlov V, Budeşti, Văleni, Topleţ, Cozia, Tuşnad, Ştirbăţ, Vatra Dornei (Albu 1980).

P. (Tripodura) aegyptium Kieffer 1925 (I+L)
=*Polypedilum* (*Tripodura*) *vetterense* Brundin, 1949
Distribution: Dîmbovitza–Tal (Albu 1966a); Budeşti, Sinaia, Tuşnad, Iernut, Luduş, Ştirbăţ (Albu 1980); Piatra Craiului (Dâmboviţa R at Cheile Mari ale Dâmboviţei) (Tatole 2007).

P. (Tripodura) apfelbecki (Strobl 1900) (I)
=*Polypedilum apfelbecki* (Strobl, 1900)
Distribution: Budeşti, Greaca–See Albu 1966a, 1980); Sinaia (Albu 1980).

P. (Tripodura) bicrenatum Kieffer 1921 (I+L)
Distribution: Cerna (Albu and Cure 1975); Cefa Nature Park (Ateaş) (Pavelescu 2012).

P. (Tripodura) elongatum Albu 1980 (I)
Distribution: Sinaia, Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1980).

P. (Tripodura) pulchrum Albu 1980 (I)
Distribution: Budeşti (Albu 1980).

P. (Tripodura) pullum (Zetterstedt 1838) (I)
=*Polypedilum prolixitarsis* (Lundström , 1916)
Distribution: Crapina–Jijila, Jijila (Urliga,Văcăreni) (Albu 1959, 1966a, 1967b); Neajlov–Tal (Albu 1966a); Tuşnad, Lunca Bradului (Albu 1980).

P. (Tripodura) quadriguttatum Kieffer, 1921
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

P. (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803) (I+L)
=*Polypedilum* (*Tripodura*) *breviantennatum* Chernovskii, 1949
Distribution: Herculesbad, Orșova (Kowarz 1873); Bistrița (Bistrița, Hangu) (Cure 1962); Danube (Nera, Cerna, Coronini–Orșova, Eșelnița, Porțile de Fier DL: Mraconia, Bahna, Jiu–Olt, Dinu I, Gitanului I, Gostinu Ch, upstream Arges, Mostiștea Ch, Giurgiu–Borcea A, Brăila–Tulcea A, Mila 38, Sulina A, Sf. Gheorghe A, Meleaua Sacalin) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 1983, 2005); Sângiorz–Băi, Budești, Frăsinet, Caransebeș, Neajlov V, Vatra Dornei, Voroneț, Știrbăț, Iernut, Luduș, Mangalia (Albu 1963, 1966a, 1980); Argeș, Bistrița, Casimcea, Ialomița, Jiu, Moldova, Trotuș, S Vitioara, S Siutghiol, S Gălățui, S Bicaz, (Cure 1985); Mureș R (Ungheni, Gura Arieș, Sintimbru) (Szitó 1995); Barcău R: Sârg, Boghiș, Suplacu (Szitó 1997); Crișul Alb R (Brad, Ineu), Crișul Negru R (Borz), Crișul Repede R (Aleșd, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Drăgan) (Szitó and Mózes 1997, Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (Someșul Rece, downstream Dej, Odorhei, Sălsig, Pomi, Vetiș) (Szitó and Mózes 1999); Someșul Mic (Gilău, Gherla) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Olt (Cornetu–Danube) (Tatole 2002); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2004); Fagăraș Mts (Arpașu Mare R) (Tatole 2004c); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraș et al. 2008); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009).

P. (Uresipedilum) convictum (Walker 1856) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Gârla lui Eracle, Sahaua Ledeancei) (Botnariuc and Cândea 1953b, Hulea and Mustață 2002); Sebeș Mts (Gotu Br, Sebeș Br, Db Sebeș R, Oașa L) (Botnariuc 1956; Urliga (Albu 1959); Bistrița (Bicaz DL: Izvorul Alb, Bistricioara) (Cure 1962); Danube (Porțile de Fier: Orșova, Eșelnița, Dinu I, Mahâru Pump Station, Mocanu I, Gostinu Ch, Giurgiu–Borcea A, Sulina A, Sf. Gheorghe A: Meleaua Sacalin) (Cure 1963, 1972a Albu and Cure 1975, Tatole 1983, 2005); Neajlov–Tal, Negrișoara–Tal (Albu 1966b); Retezat Mts (Agățat, Ana, Ascuns, Bucura, Bucurel, Caprelor, Florica, Gemenele, Iezilor, Lia, Negru, Porții, Radeș II, Răsucit, Stânișoara, Știrbu, Viorica, Zănoaga Ls, Bârlii, Zlătuia, Văgăuna Neagră, Netiș/Petrii Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, 1980, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009); Sinaia, Caransebeș, Lunca Bradului (Albu 1980); Argeș, Criș, Ialomița, Jiu, Moldova, Someș, Bugeac, S Gălățui, S Vitioara, Prahova–Tal (Cure 1985); Mureș R (Răstolița) (Szitó 1995); Crișul Repede (Drăgan) (Tudorancea et Tudorancea, 1998); Someș (downstream Dej, Odorhei) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Scoreiu, Vișlea, Voilea Rs, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Someșul Mic (Gilău, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005); North Dobroudja (Babadag L) (Tatole 2009); Bratia R (upper Basin) (Truță et al. 2017).

P. (Uresipedilum) cultellatum Goetghebuer 1931 (I)
Distribution: Topleț, Eșelnița V, Luduș (Albu 1980).

Genus ***Robackia*** Saether 1977

R. demeijerei (Kruseman 1933) (L)
Distribution: Danube (Nera, Orșova, km 512, Cama I) (Cure 1972a, Tatole 2005); Argeș (Copăceni, Malul Spart) (Cure 1985); Crișul Alb (Chisineu-Criș) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Saetheria*** Jackson, 1977

S. reissi Jackson, 1977
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

Genus ***Sergentia*** Kieffer, 1922

S. coracina (Zetterstedt, 1850) (L)
=*Sergentia longiventris* Kieffer, 1924
Distribution: Donaudelta (S Țihai, Antipa, Rodica, Șerbănoiul Mic) (Cure 1985); Vâlsan R (Tatole 1993c); Someșul Mic (upstream Cluj–Napoca, Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999); Danube (Cărăbulea I, km 502, upstream Mostiștea) (Tatole 2005).

Genus ***Stenochironomus*** Kieffer 1919

S. (Stenochironomus) gibbus (Fabricius, 1794) (I+L)
Distribution: Budești, Sângeorz (Albu 1966a, 1980); Danube (Eșelnița, Dinu I, km 514, km 512, km 502, Acalia, Vâna, Cărăbulea Is, km 514, km 509, Sulina, Sf. Gheorghe As (Albu 1980, Cure 1985, Tatole 2005).

S. (Stenochironomus) hibernicus (Edwards 1929 (I)
Distribution: Budești (Albu 1980).

Nomen nudum in *Stenochironomus*

S. halophila Botnariuc and Cândea-Cure, 1954 (L)
Distribution: Donaudelta (Sf. Gheorghe A, Cuibada, Razelm–Sinoe) (Cure 1985).

Genus ***Stictochironomus*** Kieffer, 1919

S. crassiforceps (Kieffer, 1921) (L)
Distribution: Someș (upstream Cluj, Odorhei) (Szitó and Mózes 1999).

S. maculipennis (Meigen, 1818) (I+L)
Distribution: Potcoava, Bahna (Albu 1980); Mureş (Gălăoaia, Gălăoaia Mare, Cofu, Bistra, Stegea Rs) (Tatole 1996).

S. pictulus (Meigen, 1830) (I)
Distribution: Sinaia, Potcoava–Plapcei V (Albu 1968).

S. sticticus (Fabricius, 1781) (I)
=*Stictochironomus histrio* (Fabricius, 1781)
Distribution: Sebeş Mts (Db Sebeş R) (Botnariuc 1956); Sinaia, Boina, Cheia (Albu 1980).

Genus ***Synendotendipes*** Grodhaus, 1987

S. dispar (Meigen, 1830) (L)
=*Endochironomus dispar* Meigen, 1830
Distribution: Donaudelta (Letea), Ft Dudu (Ilfov), Spf. Stegardin (Cure 1985, Hulea and Mustață 2002); Retezat Mts (Gemene L) (Botnariuc and Tatole 1997, Fjellheim et al. 2009); Iezer L (Slobozia Nouă) (Ciovică et al. 2005).

S. impar (Walker, 1856) (L)
Distribution: Crişul Repede (Drăgan R), Someşul Mic R (downstream Cluj–Napoca, Gilău, Apahida) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001, Tudorancea 1999).

Genus ***Tribelos*** Townes, 1945

S. intextum (Walker, 1856) (L)
Distribution: Crişul Alb (Brad) (Szitó and Mózes 1997).

Genus ***Xenochironomus*** Kieffer, 1921

X. xenolabis Kieffer, 1916 (I+L)
Distribution: Dabube Delta (Sahaua Ledeancei, Bogdaproste L in sponges) (Botnariuc and Cândea 1953b, Cure 1985); Crapina Jijila, Mureş V (Luduş) (Albu 1980).

Genus ***Zavreliella*** Kieffer 1920

Z. marmorata (van der Wulp 1859) (I+L)
Distribution: Danube Delta (Isacova) (Albu 1980); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999).

Nomina nuda in **Chironomini**

Chironomini g. l. macrophthalma (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Donaudelta, Donau, Olt, Motru, Ialomița, Prahova, Mureș, Trotuș (B Uzului) (Cure 1985)

Chironomini g. l. monoculata Botnariuc and Cure, 1954 (L)
Distribution: Bistrița (Bicaz), Danube (Iron Gates), Colentina, Casimcea, Someșul Cald, Someșul Rece, Călineasa-Tal, West Jiu (Cure 1985).

Tribe **Pseudochironomini** Sæther, 1977
Genus ***Pseudochironomus*** Malloch 1915

P. prasinatus (Staeger 1839) (L)
Distribution: Danube Delta (Roșu, Porcu Ls, Meleaua Sacalin Sf Gheorghe A) (Cure 1971, 1985, Tatole 1983); North Dobroudja (Sărat L) (Tatole 2009).

Tribe **Tanytarsini** Zavřel, 1917
Subtribe **Stempellinina** (Shilova 1976; Spies 2005)
Genus ***Stempellina*** Thienemann et Bause, 1913

S. almi Brundin, 1947 (L)
Distribution: Danube Delta (Hulea and Mustață 2002); North Dobroudja (Sulucului V) Tatole 2009).

S. bausei (Kieffer, 1911) (I+L)
Distribution: Dîmbovița V (Gălbinași–Lămoiești) (Albu 1980); Meleaua Sacalin (Sf. Gheorghe A) (Tatole 1983; Piatra Craiului (Dâmbovița R at Cheile Mari ale Dâmboviței) (Tatole 2007).

Genus ***Stempellinella*** Brundin, 1947

S. brevis (Edwards 1929) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Gemenele, Zănoaga Ls, Bârlii Br) (Albu 1972b, Tatole 1994, Cogălniceanu et al. 2009); Donau (B Mraconia), Bistrița (B Potoci), Jiu (Motru, B Tismănița), B Uzului (Trotuș) (Cure 1985); Piatra Craiului (Padina Urșilor Br, Saivane Sp, Râul Mare al Zărneștilor, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2007).

S. ciliaris (Goetghebuer, 1944) (I+L)
=*Zavrelia inopinata* Botnariuc et Candea–Cure, 1954
Distribution: Bistrița (Potoci) (Cure 1962); Danube (Mraconia) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975).

S. flavidula (Edwards, 1929) (I)
Distribution: Muntele Mic (Albu 1966b).

S. saltuum (Goetghebuer 1921) (I)
Distribution: Muntele Mic, Olt V, Sinaia (Albu 1980); Retezat Mts (Râușor, Zlătuia Rs) (Albu 1980).

Subtribe **Tanytarsina** Zavrel 1917
Genus ***Cladotanytarsus*** Kieffer, 1921

C. (Cladotanytarsus) atridorsum Kieffer, 1924 (I)
Distribution: Crapina–Jijila, Jijila, Grindul Combrei (Albu 1960c, 1967b); Ada–Kaleh (Albu 1980).

C. (Cladotanytarsus) conversus (Johannsen, 1932)
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

C. (Cladotanytarsus) difficilis Brundin, 1947 (I)
Distribution: Sinaia, Caransebeș (Albu 1980).

C. (Cladotanytarsus) mancus (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Obretinul Mare, Furtuna, Melea, Cordon) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Hulea and Mustață 2002); Sebeș Mts (Sebeș Db, Tăul Șurianu) (Botnariuc 1956); Crapina–Jijila, Jijila–Urliga (Albu 1960c, 1966, 1967b); Bistrița, Izvoru Muntelui–Bicaz Reservoir: 46°57'36"N, 26°06'33"E, Potoci Bay: 46°57'57"N, 26°06'30"E) (Cure 1962, Plăvan 2007, 2010, Dascălu et al. 2009); Danube (Coronini–Orșova, Ada–Kaleh, Crusoviţa, Cozla, Liuborajdea, Mraconia, Gostinu Ch, Mostiștea Ch, downstream Mostiștea, Giugiu–Borcea A, Sulina A, Sf. Gheorghe A, Meleaua Sacalin) (Cure 1963,1972a, Albu and Cure 1975, Tatole 1983, 2005); Budești, Potcoava (Albu 1966, 1980); Frăsinet, Poiana Brașov, Maramureș, Simeria (Albu1980); Argeș, Jiu, Prahova, Trotuș, S Victoria, S Marica, Moor Făget (Cure 1985); Crișul Alb (Chișineu-Criș), Crișul Negru (Zerind), Crișul Repede (Aleșd, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Olt (Voila R, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Someșul Mic (Gilău, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului, Șpârla Tămaşului, Padina Hotarului Brs, Bârsa Mare, Curmătura, Dâmbovicioara Rs, Bârsa Mare P) (Tatole 2003a, 2007); North Dobroudja (Alba R) (Tatole 2009); Retezat Mts (Tăul dintre Brazi L: 45°23'47"N, 22°54'06"E) (Tóth et al. 2015); Bratia R (upper Basin) (Truţă et al. 2017); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

C. (Cladotanytarsus) vanderwulpi (Edwards 1929) (I)
Distribution: Rîul Doamnei V (Albu 1966b); Tișoviţa (Albu and Cure 1975); Șvinița (Albu 1980).

C. (Lenziella) bicornutus Kieffer, 1922 (I+L)
=*Cladotanytarsus* (*Lenziella*) *wexionensis* Brundin, 1947
Distribution: Jijila–Urliga, Fundul Neagului–Crapina (Albu 1960c, 1980); Sahalin Insel, Ft Frăsinet (Cure 1985).

Genus ***Corynocera*** Zetterstedt, 1837

C. sevanica (Chernovsky, 1949) (L)
≡*Tanytarsus sevanicus* Chernovsky, 1949
Distribution: Someșul Mic (Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Micropsectra*** Kieffer, 1908

M. apposita (Walker, 1856) (I+L)
=*Micropsectra contracta* Reiss, 1965
=*Micropsectra trivialis* Kieffer, 1914
Distribution: Sebeș Mts (Gotul Sp, Sebeș Db) (Botnariuc 1956); Retezat Mts (Negru L, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a); Jiu (Livezeni) (Albu 1980); Crișul Negru (Poiana) (Szitó and Mózes 1997); Someș (confluence Arin Br) (Szitó and Mózes 1999).

M. atrofasciata (Kieffer, 1911) (I+L)
=*Micropsectra bidentata* Goetghebuer 1921
Distribution: Vinului V, Vișeul de Sus (Albu 1963, 1966b); Potcoava, Comana Cotmeana, Neajlov–Tal (Albu 1966a); Retezat Mts (Lia L, Râușor, Netiș, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 1994, Botnariuc and Tatole 1997); Cheia, Sinaia, Bușteni, Lotru, Voroneţ, Vatra Dornei, Sovata, Lunca Bradului, Tușnad (Albu 1980); Someșul Mic (Gilău, Apahida, Gherla) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Bratia R (upper Basin) (Truţă et al. 2017).

M. attenuata Reiss, 1969 (I)
Distribution: Dîmbovnic V at Drăghinești, Neajlov V at Corbii Mari (Albu 1980).

M. falax Reiss, 1969 (L)
Distribution: Someșul Mic R (Gilău, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Retezat Mts (Gemenele, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

M. insignilobus Kieffer, 1924 (L)
Distribution: Retezat Mts (Tăul dintre Brazi L: 45°23'47"N, 22°54'06"E), Gales L (Tóth et al. 2015, 2017); Făgăraş Mts. (Bâlea L: 45° 36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020).

M. junci (Meigen, 1818) (I+L)
=*Micropsectra praecox* Meigen, 1818
Distribution: Sebeşului Mts (Gotu Br, Bistra Tb, Sebeş Br, Sebeş Db, Oaşa L, Tăul Şurianu) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Galu, Hangu, Buhalniţa, Potoci, Schit, Izvorul Alb, Secu, Borul Br, Putna, Grinţieşul Mare, Bistricioara, Izvorul Muntelui Bicaz L: Ceahlău) (Cure 1962, Plăvan 2010); Vinului V (Valea Secii), Vişeul de Sus, Neajlov–Tal, Comana, Călniştea–Tal, Giurgiu, Dîmbovitza, Greaca (Albu 1963,1966b); Danube (Mraconia, Vodiţa, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963, 1972a, Albu and Cure 1975); Olt (Olteţ: Spring in Polovraci-Baia de Fier area) (Rogoz 1972); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Ana, Bucura, Caprelor, Florica, Gemenele, Negru, Radeş II, Ştirbu, Zănoaga, Lia Ls, Bârlii, Văgăuna Neagră, Netiş, Râuşor, Râul Mare Rs, Gura Zlata) (Albu 1972b, 1974a, Tatole 1994, 2004a, Botnariuc and Tatole 1997, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Câmpia Română, Oaşa (Albu 1980); Jiu, Lotru, Doftana, Ialomiţa, Trotuş (Uzului B) (Cure 1985); Alah Bair Sp (Prunescu–Arion et Tatole 1986); Dăbuleni (Ascunsa Sp and Br) (Tatole et al. 1994); Mureş (Răstoliţa, Tihu Rs) (Tatole 1995); Crişul Alb (Brad, Ineu), Crişul Negru (Poiana), Crişul Repede (Aleşd, Bologa, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Cheresig, Stâna de Vale, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Prahova (Valea Cerbului) (Preda et al. 2001, 2004); Piatra Craiului (Saivane Sp, Bârsa Tămaşului Br, Bârsa Mare P, Şpârla, Bârsa Mare, Curmătura, Dâmbovicioara in Cheile Brusturetului Rs) (Tatole 2003a, 2004b, 2007); Cefa Nature Park (Ateaş) (Pavelescu 2012).

M. lindrothi Goetghebuer, 1931 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1980); Retezat Mts (Negru, Gemene, Lia Ls, Gura Zlata) (Botnariuc and Tatole 1997).

M. logani (Johannsen, 1928)(I)
=*Micropsectra groenlandica* Soegaard Andersen, 1937
Distribution: Prahova R (Sinaia) (Tatole 2004c).

M. nana (Meigen, 1818) (I)
Distribution: Retezat Mts (Gemene Br) (Albu 1980).

M. radialis Goetghebuer, 1939 (L)
=*Lauterbornia coracina* Kieffer, 1911
Distribution: Donaudelta, Donau, Argeş, Bistriţa, Jiu, Moldova, Olt, Prahova, S Comana, Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ, Gîrleni, Vitioara, Spf Bălbăitoarea (Cure

1985); North Dobroudja (Smârdan A, Taița L) (Tatole 2009); Retezat Mts (Galeș L 1990 m) (Toth et al. 2017).

M. recurvata Goetghebuer, 1928 (I)
Distribution: Retezat Mts (Lia L) (Albu 1980).

M. roseiventris (Kieffer, 1909) (I+L)
=*Micropsectra fusca* (Meigen, 1804)
Distribution: Danube (Berzasca) (Cure 1972a); Retezat Mts (Viorica L, Văgăuna Neagră R) (Albu 1980, Tatole 1994); Prahova–Tal (Spf Stegardin), B Știrbu (Cure 1985).

M. uliginosa (Reiss, 1969) (L)
Distribution: Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Nomina dubia in *Micropsectra*

M. curvicornis (Chernovskij, 1949) (L)
Distribution: Danube (Liuborajdea, Crușovița, Camenița Mraconia, Eșelnița) (Cure 1972a, 1985, Albu and Cure 1975); Mureș (Răstolița, Tihu Rs) (Tatole 1995); Retezat Mts (Viorica, Lia Ls, Văgăuna Neagră R) (Botnariuc and Tatole 1997); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2003a).

M. lobatifrons Botnariuc and Cure , 1956 (L)
Distribution: Cerna, Jiu (downstream Livezeni) (Cure 1985); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Piatra Craiului (Bârsa Mare P) (Tatole 2003a); Izvorul Muntelui Bicaz DL) (Plăvan 2010).

Genus ***Neozavrelia*** Goetghebuer et Thienemann, 1941

N. bernensis Reiss, 1968
Distribution: Present in Romania (Spies and Saether 2013).

N. cuneipennis (Edwards, 1929) (I)
=*Neozavrelia longappendiculata* Albu, 1980
Distribution: Sovata (Albu 1980)

N. fuldensis Fitttkau, 1954 (I+L)
Distribution: Donau (Cerna, Eșelnița) (Albu and Cure 1975, Albu 1980); Sinaia (Albu 1980); Donaudelta (Sulina–A, Sahalin–Insel) (Cure 1985).

N. luteola Goetghebuer et Thienemann, 1941 (L)
Distribution: Jiu (downstream Livezeni, Motru) (Cure 1985); Piatra Craiului (Padina Urşilor Br, Bârsa Mare, Râul Mare al Zărneştilor) (Tatole 2003a, 2007).

Genus ***Paratanytarsus*** Thienemann et Bause, 1913

P. austriacus (Kieffer *in* Albrecht, 1924) (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Ana, Bucura, Negru, Gemenele, Iezilor, Porţii, Stânişoara, Ştirbu, Zănoaga, Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E, Galeş Ls, Văgăuna Neagră R, Gura Zlata, (Albu 1972b, 1974a, 1980, Botnariuc and Albu 1971a, Tatole 1994, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009, Tóth et al. 2015, 2017); Oaşa, Lotru V, Cheia (Albu 1980); Someşul Mic (Gilău, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998); Delta Dunării (Hulea and Mustaţă 2002); Piatra Craiului (Bârsa Mare R) (Tatole 2003a).

P. bituberculatus (Edwards, 1929) (I)
=*Paratanytarsus handlirschi* (Goetghebuer, 1931)
Distribution: Dâmboviţa (Plătăreşti, Dâmbovicioara in Cheile Mari ale Dâmboviţei) (Albu 1980).

P. brevicalcar (Kieffer, 1909) (I+L)
=*Paratanytarsus intricatus* Goetghebuer, 1921
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1980); Retezat Mts (Netiş R) (Tatole 1994); Piatra Craiului (Bârsa Tămaşului, Şpârla Tămaşului Brs, Bârsa Mare R) (Tatole 2004b).

P. inopertus (Walker, 1856) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila: Văcăreni, Jijila and Urliga, Popina Roşie, Grindul Berbecului–Crapina (Albu 1960c, 1966a, 1967b); Danube (Porţile de Fier: Eşelniţa, Şaica Pond, Mahâru Pump Station) (Albu and Cure 1975, Tatole 2005); Poiana Braşov, Iernut, Luduş, Mangalia, Oituzului V (Albu 1980); Olt (Viştea, Cornetu, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea) (Cure 1985, Tatole 1999); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

P. laetipes (Zetterstedt, 1850) (I)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966, 1967b, 1980).

P. lauterborni (Kieffer 1909) (I+L)
Distribution: Tăbăcăria L (Botnariuc and Cândea 1953a); Danube Delta (Gârla lui Eracle, Gârla Lopatna, Lopatna Ch, Ghiolul Orechovo, Tri–Ozera, Furtuna, Musura, Cordon, Sahaua Văcarului, Obretinul Mare) (Botnariuc and Cândea 1953a,b); Sebeş Mts. (Gotul Sp, Sebeş Db, Tăul Şurianu) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Fărcaşa, Potoci, Izvorul Alb), Bicaz DL: Izvorul Alb, Hangu, Bistricioara, Bistriţa upstream DL) (Cure 1962); Danube (Nera, Coronini–Orşova, Liuborajdea, Cruşoviţa, Berzasca, Cozla,

Cerna, Porțile de Fier DL: Mraconia, Giugiu–Borcea A, Sulina A) (Cure 1963,1972a, Albu and Cure 1975); Dîmbovitza–Tal (Albu 1966); Argeș, Casimcea, Jiu, Moldova, S Comana, Gălățui, Marica, Victoria, Bîtca Doamnei, Prahova–Tal (Cure 1985); Crișul Alb (Sp Area, Brad, Aciuța), Crișul Negru (Ștei) (Szitó and Mózes 1997); Someș (downstr Beclean) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Dridif, Vișlea Mare, Arpașu Mare, Scoreiu, Voila, Gura Lotrului, Turnu, Muereasca, Călimănești, Sălătrucel Rs, Făgăraș–Avrig, Cornetu–Danube) (Tatole 1999, 2002); Brătia (upper Basin) (Truță et al. 2017).

P. penicillatus (Goetghebuer 1928) (I+L)
Distribution: Cheia, Poiana Brașov, Dîmbovița (Plătărești, Gălbinași, Dâmbovicioara) (Albu 1980, Tatole 2007).

P. tenellulus (Goetghebuer, 1921) (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila (Albu 1966, 1967b); Danube Delta (Maliuc, S Clisciova, Roșu, Gorgova) (Albu 1980, Cure 1985).

Genus ***Rheotanytarsus*** Thienemann et Bause, 1913

R. curtistylus (Goetghebuer, 1921) (I+L)
Distribution: Neajlov–Tal (Albu 1966a, 1980); Muntele Mic (Albu 1966b; Eșelnița (Albu 1980); Crișul Repede (downstream Oradea) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Someș (Someșul Cald) (Szitó and Mózes 1999); Someșul Mic (Gilău, Gherla, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001).

R. muscicola Thienemann, 1929 (I)
Distribution: Ada–Kaleh, Cerna (Albu and Cure 1975); Sinaia, Neajlov V, Budești, Cozia, Roman, Tușnad, Știrbăț Retezat Mts: Gura Zlata (Albu 1980).

R. nigricauda Fittkau, 1960 (I+L)
Distribution: Retezat Mts (Negru, Gemene Ls, Râușor, Radeș, Zlătuia Rs, Gura Zlata) (Albu 1974a, 1980, Tatole 1994b, Botnariuc and Tatole 1997); Olt (Olteț, Brezii, Neagra, Avrig, Vișlea, Lotru Rs, Cornetu–Danube) (Cure 1985, Tatole and Prunescu–Arion 1992, Tatole 1999, 2002); Piatra Craiului (Șpârla Tămașului Br, Bârsa Mare, Curmătura Rs) (Tatole 2003a, 2007).

R. photophilus (Goetghebuer, 1921) (I)
Distribution: Budești, Neajlov–Tal (Albu 1966); Retezat Mts (Gura Zlata) (Albu 1974a); Iernut, Luduș, Tușnad, Roman (Albu 1980); Prahova R (Sinaia) (Tatole 2004c).

Nomen dubium in *Rheotanytarsus*

R. rivulorum Johannsen, 1937 (I)
Distribution: Bistrița (Fărcașa, Galu, Largu, Hangu, Buhalnița, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Izvorul Muntelui, Bicaz, Putna, Pintec, Grințieșul Mare) (Cure 1962); Danube (Cozla, Mraconia, Cerna, Berzasca, Crusovița, Liuborajdea) (Cure 1972a, Albu and Cure 1975); Olt (Dridif, Brezii, Sâmbăta, Valea Cașilor, Neagra, Muereasca Rs) (Tatole 1985, Tatole and Prunescu–Arion 1992); Someșul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Sublettea*** Roback, 1975

S. coffmani (Roback, 1975) (L)
Distribution: Someșul Mic (Apahida, Gherla) (Tudorancea et Tudorancea 2000–2001).

Genus ***Tanytarsus*** van der Wulp, 1874

T. bathophilus Kieffer 1911 (I+L)
=*Calopsectra tripunctata* Reiss, 1968
Distribution: Danube (Jiu–Olt, Giurgiu–Borcea A) (Cure 1963); Bicaz DL (Bistricioara–Călugăreni, Ceahlău) (Cure 1967); Retezat Mts (Căldarea Berbecilor Sp, Negru, Bucura, Lia Ls) (Albu 1972b, 1980, Botnariuc and Albu 1971a, 1971b, Tatole, 2004c).

T. brundini Lindeberg, 1963 (L)
Distribution: Crișul Repede (downstream Oradea), Someșul Mic (Gilău, Gherla, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Crișul Repede (Fughiu) (Tudorancea 1999); Retezat Mts (Negru, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

T. chinyensis Goetghebuer, 1934 (I)
Distribution: Sinaia (Albu 1968b).

T. curticornis Kieffer, 1911 (I+L)
Distribution: Oașa (Albu 1980); Mureș (Bistra, Stegea Rs) (Tatole 1996); Crișul Alb (Brad, Aciuța, Ineu), Crișul Negru (Poiana, Ștei, Borz), Crișul Repede (upstream Odorhei, Cheresig, Iad) (Szitó and Mózes 1997); Piatra Craiului (Șpârla Tămașului Br, Curmătura R) (Tatole 2003a, 2004c, 2007).

T. eminulus (Walker, 1856) (I)
Distribution: Cerna, Topleț (Albu and Cure 1975, Albu 1980).

T. excavatus Edwards, 1929 (I)
Distribution: Jijila, Urliga, Grindul Berbecului–Crapina, Grindul Combrei (Albu 1960c, 1966, 1967b); Maliuc, Mangalia, Snagov (Albu 1980); Capul Midia–Capul Kaliakra (Dobrogea) (Făgăraş et al. 2008).

T. glabrescens Edwards, 1929 (I+L)
Distribution: Crapina–Jijila, Grindul Combrei (Albu 1960c, 1966, 1967b, 1980); Oltenitza (Chirnogi) (Albu and Botnariuc 1966, Albu 1980); S Victoria (Cure 1985).

T. gracilentus (Holmgren, 1883) (L)
Distribution: Crişul Negru (Tinca), Crişul Repede (Spring area) (Szitó and Mózes 1997); Someş (upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999).

T. gregarius Kieffer, 1909 (I+L)
=*Tanytarsus lobatifrons* Kieffer, 1913
Distribution: Danube Delta (Gârla Lopatna, Roşuleţ, Cordon, Obretinul Mic, Cuibeda, Sahaua Văcarului, Mila 23) (Botnariuc and Cândea 1953a,b, Hulea and Mustaţă 2002); Sebeş Mts (Spring near Şurianu) (Botnariuc 1956); Bistriţa (Buhalniţa, Potoci, Bistricioara, Schit, Izvorul Alb, Bicaz, Putna, Grinţieşul Mare) (Cure 1962); Danube (Porţile de Fier (Liuborajdea, Cruşoviţa, Dubova, Cerna, Balina, Păsărica, Cama, Acalia, Pietriş, Gitanului, Mocanu Is, km 514, km 508, km 507, Gostinu Ch, km 502) (Cure 1963, 1972a, Tatole 2005); Retezat Mts (Negru, Gemenele, Bucura, Lia, Iezilor, Porţii, Radeş II, Viorica, Zănoaga Ls, Bârlii, Văgăuna Neagră Rs) (Albu 1972b, 1980, Botnariuc and Albu 1971a, 1971b, Botnariuc and Tatole 1997, Tatole 1994, 2004a, Cogălniceanu et al. 2009, Fjellheim et al. 2009); Argeş, Casimcea, Moldova, Prahova (Cure 1985); Crişul Alb (Aciuţa), Crişul Negru (Poiana, Borz), Crişul Repede (Bologa, downstream Ciucea, upstream Odorhei, Fughiu, Stâna de Vale, Iad) (SzitóetMózes 1997); Someş (Someşul Cald, Someşul Rece, upstream Cluj) (Szitó and Mózes 1999); Olt (Făgăraş–Avrig, Muereasca, Călimăneşti Rs) (Tatole 1985, 1999, 2002); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999); Fagăraş-Iezer-Păpuşa Mts (Vâlsan R, Brătia R), Baiului Mts (Retevoi Br, Valea Lacul Roşu Br, Unghia Mică R, Azuga R confluence Unghia Mică R) (Tatole 1993c, 2004c).

T. heusdensis Goetghebuer, 1923 (I)
Distribution: Voroneţ, Boina, Cheia (Albu 1980).

T. lactescens Edwards, 1929 (I)
Distribution: Snagov L (Albu 1980).

T. lestagei Goetghebuer, 1922 (L)
Distribution: Crişul Repede (Drăgan R), Someşul Mic (upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea and Tudorancea 1998); Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009).

T. lugens (Kieffer, 1916) (L)
Distribution: Făgăraş Mts (Bâlea L: 45°36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

T. mendax Kieffer, 1925 (I+L)
=*Tanytarsus holochlorus* Edwards, 1929
Distribution: Crapina–Jijila (Jijila–Urliga, Popina Roşie–Crapina, Grindul Combrei) (Albu 1960c, 1966a, 1967b, 1980); Chirnogi, Budeşti, Bertești (Albu 1966a, Albu and Botnariuc 1966); Danube Delta (Hulea and Mustață 2002); Retezat Mts (Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E, Galeş Ls) (Tóth et al. 2015, 2017) Făgăraş Mts (Bâlea L: 45° 36'11"N, 24°36'55"E) (Szabó et al. 2020); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

T. occultus Brundin, 1949 (I)
Distribution: Poiana Braşov (Albu 1980).

T. palettaris Verneaux, 1969 (I+L)
Distribution: Sinaia (Albu 1980, Tatole 2004c); Someşul Mic (Gilău) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 2000–2001); Retezat Mts (Ascuns, Gemenele, Răsucit Ls) (Cogălniceanu et all. 2009).

T. pallidicornis (Walker, 1856) (I)
Distribution: Retezat Mts (Tăul dintre Brazi: 45°23'47"N, 22°54'06"E, Galeş Ls) (Tóth et al. 2015, 2017); Szabó et al. 2020; Făgăraş Mts (Bâlea L: 45° 36'11"N, 24°36'55"E); Harghita Mts (Sfânta Ana L) (Toth et al. 2021).

T. quadridentatus Brundin, 1947 (I+L)
Distribution: Donau (Cerna, Eşelnița, Topalu–Giurgiu) (Albu and Cure 1975, Albu 1980, Cure 1985); Jiu (Livezeni) (Cure 1985).

T. sinuatus Goetghebuer, 1936 (I+L)
Distribution: Făgăraş Mts (Podragu L) (Albu 1980); Bratia R (upper Basin) (Truță et all. 2017).

T. sylvaticus (van der Wulp, 1859) (I+L)
Distribution: Mostiștea (Frăsinet) (Albu 1980, Cure 1985).

T. usmaënsis Pagast 1931 (I+L)
Distribution: Danube (Eşelnița, Mraconia) (Albu 1980, Albu and Cure 1975); Donaudelta (S Roşu, Merhei, Cordon, Lopatna, Letea, Maliuc) (Cure 1985); Buşteni, Tuşnad, Olt (Cibin, Obârşia Lotrului) (Albu 1980); Bistricioara (Cure 1985); Retezat Mts (Gemenele L) (Cogălniceanu et al. 2009).

T. volgensis Miseiko, 1967 (I+L)
=*Tanytarsus fimbriatus* Reiss et Fittkau, 1971
Distribution: Danube Delta (Maliuc, Sahalin), Crapina–Jijila, Chirnogi, Olt V, Neajlov V, Plapcea V, 2 Mai, Ştirbăţ, Iron Gates, Sîmbăta de Sus (Albu 1980, Cure, 1985).

Genus ***Virgatanytarsus*** Pinder, 1982

V. arduennensis (Goetghebuer, 1922) (L)
Distribution: Crişul Negru (Tinca) (Szitó and Mózes 1997); Someşul Mic (Gilău, upstream Cluj–Napoca) (Tudorancea 1999, Tudorancea and Tudorancea 1998, 2000–2001); Crişul Repede (Fughiu) (Tudorancea 1999); Retezat Mts (Ascuns, Negru, Zănoaga Ls) (Cogălniceanu et al. 2009).

V. triangularis (Goetghebuer, 1928) (I)
=*Tanytarsus reflexens* Edwards, 1929
Distribution: Crapina–Jijila, Jijila–Urliga (Albu 1960c, 1966a, 1967b, 1980); Caransebeş (Albu 1980).

Discussions and Conclusions

Present checklist catalogues 722 taxa (6 subfamilies, 13 tribes, 2 subtribes, 142 genera, 42 subgenera and 517 species), 179 more than the precedent one (Tatole 2000): 543 taxa: 6 subfamilies, 12 tribes, 122 genera and 403 species.

From the newly listed 179 taxa, 114 are species, representing almost a quarter (22.05%) of the cited species. The number of species, in each of the subfamilies cited in the present list, compared to the previous one, is as follows: Tanypodinae 49 species to 38, Diamesinae 25 to 18 species, Telmatogetoninae constant at 1 species, Prodiamesinae constant at 4 species, Orthocladiinae 225 to 176 species and Chironominae 213 to 166 species.

Overall, the numerical proportion of species for each Chironomidae subfamily is similar to the one ascertained in 2000, the same two groups being noticed: a clearly dominant one (84.72%), which includes the Orthocladiinae and Chironominae subfamilies, and the second, containing the other four subfamilies, with only 15.28% altogether.

Among the 517 species, 477 are valid species, 37 are Nomina dubia and 3 species are Nomina nuda (Ashe and Cranston 1990, Ashe and O'Connor 2012, Spies 2005a,b, Spies and Sæther 2004, Spies and Saether 2013).

Most of the non-valid species are ones described as larva and presented in this list since they are listed in larva keys still in use, such as Botnariuc and Cure 1999, Chernovsky 1949, Pankratova 1970, 1977, 1983, Wiederholm 1983.

Genus *Paratrichocladius* Santos Abreu, 1918 is considered a subgenus of *Cricotopus* van der Wulp, 1874 (Cranston and Krosch 2015, Rossaro et al. 2019).

The first two checklists Albu (1966) and Cure (1985) also include occurrence data in Romania, the former for 125 taxa, and the latter for 402 taxa.

Our list includes distribution data for 487 species (185 were identified both as adults and larva stages, 128 only adult stage and 175 only larval stage). The chorological data presented span almost 150 years, as the oldest citation is from 1873, and the newest from 2021. For each chorological citation the source is given.

The next 3 species are cited for the first time in Romanian fauna: *Orthocladius* (*Orthocladius*) *dentifer* Brundin, 1947, *Smittia leucopogon* (Meigen, 1804) and *Smittia pratorum* (Goetghebuer, 1927).

The following 4 species are endemic to Romania: *Smittia antelobata* Albu, 1970 for Cazanele Mici and Dealul Șeplea (Cerna Valley), *Georthocladius* (*Georthocladius*) *retezati* (Albu, 1972) and *Helleniella extrema* Albu, 1972 for Retezat Mts and *Paratendipes sinelobus* Albu, 1980 for Neajlov Valley. They are still known only from the areas they were identified in.

According to the Fauna Europaea, *Cardiocladius leoni* Goetghebuer, 1932 is present only in România (Spies and Saether 2013).

Following some paleolimnological studies of alpine lakes Tăul dintre Brazi and Galeș in Retezat Mts (Tóth et al., 2015, 2017), Sf. Ana in Harghita Mts (Tóth et al. 2021) and Bâlea in Făgăraș Mts (Szabó et al. 2020), the following 11 species were cited for the first time in Romanian fauna: *Diamesa* (*Diamesa*) *cinerella*, *D* (*D*) *zernyi, Chaetocladius* (*Chaetocladius*) *dentiforceps, Corynoneura arctica, Cricotopus* (*Isocladius*) *intersectus, Eukiefferiella fittkaui, Orthocladius* (*Orthocladius*) *nitidoscutellatus, O* (*O*) *oliveri, Psectrocladius* (*Mesopsectrocladius*) *barbatipes, Micropsectra insignilobus* and *Tanytarsus pallidicornis*.

For the next 37 species, valid chorological information are given, while Fauna Europaea,

1. either *does not confirm their presence in Romania,* 28 species: *Macropelopia adaucta* Kieffer, 1916, *Diamesa* (*Diamesa*) *cinerella* Meigen, 1835, *D* (*D*) *zernyi* Edwards, 1933, *Chaetocladius* (*Chaetocladius*) *dentiforceps* (Edwards, 1929), *Corynoneura arctica Kieffer, 1923, Cricotopus* (*Isocladius*) *intersectus* (*Staeger, 1839*), *Eukiefferiella fittkaui* Lehmann, 1972, *Gymnometriocnemus* (*Gymnometriocnemus*) *subnudus* (Edwards,1929), *Halocladius* (*Halocladius*) *millenarius* (*Santos Abreu, 1918*), *Hydrobaenus lugubris* Fries, 1830, *Orthocladius* (*Orthocladius*) *dentifer* Brundin, 1947, *O* (*O*) *nitidoscutellatus* Lundström, 1915, *Paralimnophyes longiseta* (Thienemann, 1919), *Propsilocerus paradoxus* (Lundström, 1915), *Psectrocladius* (*Mesopsectrocladius*) *barbatipes* Kieffer, 1923, *Pseudosmittia gracilis* (Goetghebuer, 1913), *Smittia leucopogon* (Meigen, 1804), *S pratorum* (Goetghebuer, 1927), *Thienemannia gracei* (Edwards, 1929), *Thienemanniella flavescens* (Edwards, 1929), *Tvetenia tshernovskii* (Pankratova, 1968), *Cryptochironomus* (*Cryptochironomus*) *supplicans* (Meigen, 1830), *Cryptotendipes nigronitens* (Edwards, 1929), *Paratendipes plebeius* (Meigen, 1818), *Polypedilum* (*Pentapedilum*) *uncinatum* (Goetghebuer, 1921),

Micropsectra insignilobus Kieffer, 1924, *Tanytarsus chinyensis* Goetghebuer, 1934, *T pallidicornis* (Walker, 1856),

2. or considers them *doubtfully present in Romania,* 9 species: *Protanypus morio* (Zetterstedt, 1838), *Chaetocladius* (*Chaetocladius*) *sueccicus* (Kieffer, 1916), *Orthocladius* (*Eudactylocladius*) *priomixtus* Saether, 2004, *O* (*Orthocladius*) *excavatus* Brundin, 1947, *O* (*O*) *rhyacobius* Kieffer, 1911, *Paratrichocladius skirwithensis* (Edwards, 1929), *Smittia terrestris* (Thienemann et Strenzke, 1941), *Glyptotendipes* (*Caulochironomus*) *viridis* (Macquart, 1834), *Polypedilum* (*Pentapedilum*) *exsectum* (Kieffer 1916).

On the other hand, for the next 30 species we do not have occurence data. They were listed from the following sources:

1. *Axarus fungorum* (Albu, 1980) is *doubtfully present in Romania* (Albu, 1980);
2. (*Ablabesmyia*) *aspera* (Roback, 1959) and *Glyptotendipes* (*Glyptotendipes*) *glaucus* (Meigen, 1818) are *doubtfully present in Romania* (Botnariuc and Cure 1999);
3. *Paramerina anomala* Beck et Beck, 1966, *Boreoheptagyia brevitarsis* (Tokunaga, 1936), *Protanypus pseudomorio* Makarchenko, 1982, *Brillia flavifrons* (Johannsen, 1905), *Orthocladius* (*Eudactylocladius*) *gelidorum* (Kieffer, 1923), *Parametriocnemus lundbeckii* (Johannsen, 1905), *Glyptotendipes* (*Caulochironomus*) *foliicola* Contreras–Lichtenberg, 1997, *Paratendipes subaequalis* (Malloch, 1915), are *doubtfully present in Romania* (Spies and Saether 2013);
4. *Natarsia nugax* (Walker, 1856), *Telopelopia fascigera* (Verneaux, 1970), *Thienemannimyia northumbrica* (Edwards, 1929), *Cardiocladius capucinus* (Zetterstedt, 1850), *Hydrosmittia ruttneri* Strenzke et Thienemann, 1942, *Chaetocladius* (*Chaetocladius*) *gracilis* Brundin, 1956, *Limnophyes natalensis* (Kieffer, 1914), *Nanocladius* (*Nanocladius*) *distinctus* (Malloch, 1915), *Neobrillia longistyla* Kawai, 1991, *Psectrocladius* (*Psectrocladius*) *fabricus* Zelentsov, 1980, *Tvetenia paucunca* (Saether, 1969), *Chernovskiia macrocera* Saether, 1977, *Dicrotendipes lobiger* (Kieffer, 1921), *Lipiniella moderata* Kalugina, 1970, *Nilomyia aculeata* Kieffer, 1921, *Polypedilum* (*Tripodura*) *quadriguttatum* Kieffer, 1921, *Saetheria reissi* Jackson, 1977, *Cladotanytarsus* (*Cladotanytarsus*) *conversus* (Johannsen, 1932), *Neozavrelia bernensis* Reiss, 1968, are *present in România* (Spies and Saether 2013).

This list, through verifying and updating its taxonomic structure, offering ample chorological data, and presenting a generous bibliographic material, represents an opportune and needed contribution to a better understanding of the structure of Family Chironomidae in Romania.

Acknowledgements

We are grateful to the reviewers for their constructive suggestions which improved the quality of the manuscript.

References

Albu P (1959) Tendipedide adulte din Complexul de bălți Crapina-Jijila (Notă preliminară). Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animală 11(3): 205–216. [in Romanian]

Albu P (1960a) *Harnischia fittkaui* n. sp. (Diptera, Tendipedidae). Comunicări Academia RPR 10(1): 47–53. [in Romanian]

Albu P (1960b) Tendipedide adulte din Complexul de bălți Crapina-Jijila (Nota 2). Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animală 12(1): 33–43. [in Romanian]

Albu P (1960c) Tendipedide adulte din Complexul de bălți Crapina-Jijila (Nota 3). Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animală 12(3): 265–272. [in Romanian]

Albu P (1963) Chironomide (adulte) din bazinul Someşului şi al Vişeului (Munţii Rodnei). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 15(2): 223–236. [in Romanian]

Albu P (1964a) *Smittia edwardsi* Goetgh as synonym to *Smittia aterrima* Meig (Diptera Chironomidae. Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie 9(4): 237–243.

Albu P (1964b) A new species of Chironomidae (Diptera) in the Rumanian fauna: *Cricotopus dobrogicus* n. sp. Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie 9(5): 307–312.

Albu P (1966a) Verzeichnis der bis jetzt aus Rumänien bekannten Chironomiden. Gewässer und Abwässer (41/42): 145–149. [in German]

Albu P (1966b) Chironomide din Carpații Românești (1). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 18(3): 193–217. [in Romanian]

Albu P (1967a) Chironomide din Carpații Românești (2). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 19(1): 15–25. [in Romanian]

Albu P (1967b) Chironomide adulte din Complexul de Bălți Crapina–Jijila (4). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 19(2): 89–94. [in Romanian]

Albu P (1968a) Chironomide din Carpații Românești (3). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 20(5): 455–467. [in Romanian]

Albu P (1968b) Chironomide din Carpații Românești (4). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 20(6): 539–546. [in Romanian]

Albu P (1970) *Smittia antelobata*, o nouă specie din Familia Chironomidae (Diptera). Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 22(2): 101–105. [in Romanian]

Albu P (1972a) Două specii de chironomide noi pentru știință în Masivul Retezat. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie (1): 15–20. [in Romanian]

Albu P (1972b) Chironomidae (Diptera) din câteva lacuri din masivul Retezat. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie (4): 309–315. [in Romanian]

Albu P (1974a) Dinamica chironomidelor capturate într-o capcană cu lumină la Gura Zlata (Retezat). SARGETIA/Scientia Naturae 10: 129–137. [in Romanian]

Albu P (1974b) A new Subgenus of the Genus *Bryophaenocladius* and two new species (Diptera, Chironomidae). The Entomologisk Tidskrift 95: 9–12 Suppl.

Albu P (1980) Insecta Diptera: Fam Chironomidae–Subfam Chironominae. Fauna RSR Edit Acad RSR 11(13): 1–320 [in Romanian]

Albu P, Botnariuc N (1966) Les Chironomidés de la rizière de Chirnogi (Oltenitza-Roumanie). Gewässer und Abwässer 41/42: 48–63. [in French]

Albu P, Ciubuc C (1972) *Leptochironomus deribae* Freeman, 1957 specie nouă în fauna RSR. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 24(6): 521–525. [in Romanian]

Albu P, Cure V (1975) Fauna zonei "Porțile de Fier". Diptera–Chironomidae. Seria Monografică "Porțile de Fier". Ed. Academiei Române 270–276 [in Romanian]

Ashe P (1992) Corrections to the Chironomidae Part of The Catalogue of Palaearctic Diptera. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 26(2–4): 215–221.

Ashe P, Cranston PS (1990) Family Chironomidae. Catalog of Palaearctic Diptera, Psychodidae-Chironomidae. Edit: A. SOÓS. Acad Kiadó (2): 113–499.

Ashe P, O'Connor JP (2012) Additions and corrections to Part 1 of 'A World Catalogue of Chironomidae (Diptera). Proceedings of the 18th International Symposium on Chironomidae. Fauna Norvegica (31): 125–136.

Botnariuc N (1956) Tendipedidae (larve) din Munţii Sebeşului. Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 8(2): 483–495. [in Romanian]

Botnariuc N, Albu P (1956) *Propsilocerus danubialis* n. sp. (Diptera, Tendipedidae). Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 8(2): 497–504. [in Romanian]

Botnariuc N, Albu P (1958) *Halliella taurica* Tshernovskij, 1949, eine zirkumpontische Art (Diptera, Tendipedidae). Beiträge zur Entomologie Bd 8(5–6): 697–710. [in German]

Botnariuc N, Albu P (1966a) *Cricotopus sylvestris* Fabr chironomide nuisible au riz. Gewässer und Abwässer (41/42): 64–69. [in French]

Botnariuc N, Albu P (1966b) К биологии *Cricotopus sylvestris* Fabr (Diptera, Chironomidae) как вредителя риса. Екология водных организмов. Akad Nauk CCCR 137–141. [in Russian]

Botnariuc N, Albu P (1971a) Observaţii asupra unor anomalii la câteva specii de chironomide (Diptera) din masivul Retezat. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 23(1): 7–19. [in Romanian]

Botnariuc N, Albu P (1971b) Chironomids (Diptera) from the Retezat Massif of the southern Carpathians, Romania. The Canadian Entomologist (103): 471–476.

Botnariuc N, Cândea V (1953a) Câteva larve de Tendipedidae noi sau rare, găsite în R.P.R. Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 5(1): 49–58. [in Romanian]

Botnariuc N, Cândea V (1953b) Contribuţii la cunoaşterea larvelor de Tendipedidae din Delta Dunării. Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 5(3): 525–541. [in Romanian]

Botnariuc N, Cure V (1999) Determinator al larvelor de Chironomidae. Ed. Academiei Române 1–144. [in Romanian]

Botnariuc N, Popovici C (1956) Unele aspecte ale dinamicii populaţiei de *Tendipes* f. l. *plumosus* L. şi *T.* f. l. *thummi* Kieff. Analele Univiversităţii C I Parhon/Ştiinţele Naturii (9): 121–127. [in Romanian]

Botnariuc N, Tatole V (1997) Chironomidofauna Masivului Retezat. Ocrotirea Naturii şi a Mediului Inconjurător 41(1–2): 23–32. [in Romanian]

Botnariuc N, Albu P, Ignat Gh (1966) Contribuţii la cunoaşterea dinamicii populaţiilor de *Cricotopus sylvestris* Fbr. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 18(3): 177–193. [in Romanian]

Botnariuc N, Albu P, Ignat Gh (1969) The variability of a population of *Cricotopus sylvestris* F in the Danube flood plain. Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie 14(5): 363–374.

Cândea V (1954) O larvă nouă de tendipedid *Orthocladius* l. *barbata*, Cândea şi două Tendipedidae noi pentru fauna Republicii Populare Române. Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 6(1): 309–317. [in Romanian]

Chernovsky A A (1949) Opredeliteli lichinok komarov semeistva Tendipedidae. Izv Akad Nauk SSSR 1–186. [in Russian]

Ciovică C, Tatole V, Tenciu M, Olaru M (2005) Manual de prezentare a unor soluţii tehnico-economice pentru exploatările piscicole din sud-estul României integrate intr-un concept modern de management. Program AGRAL. Instutul Cercetare-Dezvoltare Economie Agrară 1–67. [in Romanian]

Cogălniceanu D, Tudorancea M, Preda E, Gâldean N (2009) Evaluating diversity of Chironomid (Insecta: Diptera) communities in alpine lakes, Retezat National Park (Romania). Advances Limnology (62): 191–213.

Cranston P, Krosch M (2015) DNA sequences and austral taxa indicate generic synonymy of *Paratrichocladius* Santos-Abreu with *Cricotopus* Wulp (Diptera: Chironomidae). Systematic Entomology 40: 719–732. DOI: 10.1111/syen.12130.

Cure V (1962) Contribuţii la cunoaşterea faunei de chironomide (larve) din Râul Bistriţa, în zona Lacului de acumulare de la Bicaz, înainte şi în primul an de inundare. Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 21(1): 14–35. [in Romanian]

Cure V (1963) Contribuţii la cunoaşterea tendipedidelor (larve) din sectorul romînesc al Dunării. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 15(2): 247–272. [in Romanian]

Cure V (1967) Contribuţii la cunoaşterea faunei de chironomide din Lacul de acumulare de la Bicaz, după şase ani de inundare (1961–1966). Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 26(2): 5–17. [in Romanian]

Cure V (1971) Contribuţii la cunoaşterea faunei de Chironomide (Diptera) din România. Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 30(3–4): 5–39. [in Romanian]

Cure V (1972a) Contribuţii la cunoaşterea faunei de chironomidae (larve) din Dunăre şi afluenţi între Km 941 şi Km 1075 înainte şi în primul an după inundarea lacului de acumulare de la Porţile-de-Fier (1971). Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 31(1–2): 5–20. [in Romanian]

Cure V (1972b) *Lauterborniella agrayloides* Kieff (Diptera, Chironomidae), nouă pentru fauna României. Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 31(1–2): 39–43. [in Romanian]

Cure V (1972c) Două tanypodine (Diptera-Chironomidae) noi pentru fauna României, Buletinul Institutului de Cercetări şi Proiectări Piscicole 31(3–4): 7–17. [in Romanian]

Cure V (1985) Chironomidae (Diptera-Nematocera) aus Rumänien unter besoderer Berücksichtigung jener aus dem hydrographischen Einzugsgebiet der Donau. Archiv für Hydrobiologie Supplement 68(2): 163–217. [in German]

Damian A, Botoşăneanu L (1954) Cercetări hidrobiologice în conducta de apă a oraşului Bucureşti. Buletin Ştiinţific/Ştiinţe Biologice Agricole Geologice şi Geografice 6(4): 1157–1172. [in Romanian]

Dascălu MM, Novac A, Neagu A-N, Miron I (2009) Chironomid larvae communities from the fish farm area of Izvoru Muntelui-Bicaz Rezervoir. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Secţiunea Biologie Animală 55: 61–66.

Făgăraş M, Skolka M, Anastasiu P, Cogălniceanu D, Negrean G, Bănică G, Tudor M, Samoilă C (2008) Biodiversitatea zonei costiere a Dobrogei dintre Capul Midia şi Capul Kaliakra. Ed. Ex Ponto. Constanţa. 1–451. [in Romanian]

Fjellheim A, Raddum G. G, Vandvik V, Cogalniceanu D, Boggero A, Brancelj A, Galas J, Sporka F, Vidinova Y, Bitusik P, Dumnicka E, Gâldean N, Kownacki A, Krno I, Preda E, Rîsnoveanu G, Stuchlik E (2009) Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A study of remote European freshwater lakes. Advances Limnology 62: 167–190

Giaime M, Magne G, Bivolaru Al, Gandouin E, Marriner N, Morhange C (2018) Halmyris: Geoarchaeology of a fluvial harbour on the Danube Delta (Dobrogea, Romania). The holocene. London: Sage, 29(2)

Hulea O, Mustaţă Gh (2002) Spatio-temporal distribution of the Subfamily Chironomidae (Diptera – Nematocera) in the Danube Delta. Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" Tulcea 62–70.

Kowarz F (1873) Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. (23): 453–464. [in German]

Ignat Gh, Gruia L (1973) Observaţii cu privire la nutriţia larvelor de *Chironomus* f.l. *plumosus* din apele zonei inundabile ale Dunării. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 25(2): 137–151. [in Romanian]

Nicoară M, Erhan M, Plăvan G, Cojocaru I, Davideanu A, Nicoară A (2009) The ecological complex role of the macroinvertebrate fauna from the R Ciric. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Secţiunea Biologie Animală 55: 125–132.

Pankratova V (1970) Lichinki i kukolki komarov podsemeistva Orthocladinae fauny SSSR (Diptera–Chironomidae=Tendipedidae). Opred po faune SSSR 102: 1–343. [in Russian]

Pankratova V (1977) Lichinki i kukolki komarov podsemeistva Podonominae i Tanypodinae fauny SSSR (Diptera–Chironomidae=Tendipedidae). Opred po faune SSSR 112: 1–152. [in Russian]

Pankratova V (1983) Lichinki i kukolki komarov podsemeistva Chironiminae fauny SSSR (Diptera–Chironomidae=Tendipedidae). Opred po faune SSSR 132: 1–296. [in Russian]

Pavelescu Cl (2012) The structure of oligochaeta and chironomidae communities from the aquatic ecosistems of the Cefa Nature Park (Crişana, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research 13: 69–81. [in Romanian]

Plăvan G (2010) Studies on the distribution and biomass of chironomids from Izvoru Muntelui-Bicaz Reservoir. Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iași, Secțiunea Biologie Animală 56: 35–41.

Plăvan G, Nicoară M, Apetroaiei N, Plăvan O (2012) The effects of fish cage aquaculture on the profoundmacrozoobenthos in the oligo-mesotrophic reservoir Izvoru Muntelui Bicaz (Romania). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(2): 145–148.

Plăvan G I, Simalcsik F, Miron I (2007) Contribution to the study of the macrozoobenthos of the Izvoru Muntelui–Bicaz Reservoir (Romania). Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iași, Secțiunea Biologie Animală 53: 21–27.

Popescu A, Ibanescu D, Vasilean I, Nica A (2015) Preliminary aspects concerning macroinverte-brates qualitative structure in the Danube River. Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Științifice - Seria Zootehnie (65): 130–133.

Popescu-Marinescu V, Năstăsescu M (1987) Date asupra faunei bentonice din lacurile Sărăturile şi Plopu (Dobrogea) Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animală 39(1): 79–88, București. [in Romanian]

Preda El, Ciubuc C, Ciolpan O (2001) On litter decomposition and associated invertebrates. Revue Roumaine de Biologie. Série biologie animale 46(1–2): 23–30.

Preda El, Ciubuc C, Ciolpan O (2004) Relationship between chironomid communities and riparian forest. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 47: 335–343.

Prunescu-Arion E, Tatole V (1986) Contributții la cunoașterea faunei acvatice din rețeaua hidrografică din Dealul la Carieră (Allah-Bair), Dobrogea. Studii şi cercetări de biologie. Seria zoologie 38(2): 151–155. [in Romanian]

Rogoz I (1972) Contribuţii la cercetarea faunei izvoarelor din bazinul râului Olteţ, în sectorul muntos și al depresiunii subcarpatice Polovraci–Baia de Fier. Studii și Comunicări Muzeul Știițele Naturii Bacău 15–20. [in Romanian]

Rossaro B, Pirola N, Marziali L, Magoga G, Boggero A, Montagna M (2019) An updated list of chironomid species from Italy with biogeographic considerations (Diptera, Chironomidae). Biogeographia. The Journal of Integrative Biogeography 34: 59–85. DOI: 10.21426/B634043047

Spies M (2005a) An index to selected scientific names in Edwards'(1929) Monograph on British Chironomidae. Chironomus Newsletter On Chironomidae Research (18): 11–25.

Spies M. (2005b) On selected family-group names in Chironomidae (Insecta, Diptera), and related nomenclature. Zootaxa 894: 1–12. www.mapress.com/zootaxa, ISSN 1175–5334

Spies M, Sæther O A (2004) Notes and recommendations on taxonomy and nomenclature of Chironomidae (Diptera). Zootaxa 752. http://www.mapress.com/zootaxa

Spies M, Saether O A (2013) Fauna Europaea: Chironomidae. In: Beuk P, Pape T (Eds) Fauna Europaea: Diptera, Nematocera, Flies. Fauna Europaea version 2017.06, https: // fauna-eu.org

Stoica N (1967) Cercetări hidrobiologice şi piscicole asupra râului Vâlsan afluent al Argeşului. Comunicari Zoologie 5: 105–107. [in Romanian]

Strobl G (1896) Siebenbürgische zweiflügler. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt (46): 11–48. [in German]

Szabó Z, Buczkó K, Haliuc A, Pál I, Korponai L J, Begy R-C, Veres D, Luoto P T, Zsigmond R A, Magyari K (2020) Ecosystem shift of a mountain lake under climate and human pressure: A move out from the safe operating space. Science of The Total Environment, Volume 743, 15 November.

Szitó A (1994) New data about chironomids in the Danube Delta. Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării 47–50.

Szitó A (1995) Macrozoobenthos in the Maros (Mureş) River. The Maros/Mureş River Valley. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the River and enviroment. TISCIA monograf series. Szolnok-Szeged-Târgu Mureş 185–192.

Szitó A (1997) The crude oil pollution effect on the macrozoobenthos in the River Barcău/ Berettyö. The Criş/Koros River'Valleys. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the River system and its environment, TISCIA ms. Szolnok-Szeged-Târgu Mureş 211–241.

Szitó A (1999) The ecological state of the Tisa River and its tributaries indicated by the macroin-vertebrates. TISCIA monograf series. Szeged 99–148.

Szitó A, Mózes K (1997) The Oligochaeta and the chironomida fauna as pollution indicators in the Criş/Koros River system. The Criş/Koros River'Valleys. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the River system and its environment TISCIA monograf series. Szolnok-Szeged-Târgu Mureş 165–194.

Szitó A, Mózes K (1999) The Oligochaeta and the chironomida fauna in the River Someş/ Szamos system. The Someş/Szamos River Valley, TISCIA monograf series Szolnok 179–191,

Tatole V (1983) Observaţii asupra unor relaţii stabilite în cadrul asociaţiilor de chironomide (larve) fitofile din Meleua Sacalin. Hidrobiologia 18: 121–125. [in Romanian]

Tatole V (1985) Implicaţiile barării asupra biocenozelor acvatice a şase lacuri de acumulare pe râul Olt (zona Turnu-Govora). Al 3-lea Simpozion "Bazele biologice ale proceselor de epurare si protecţia mediului"Piteşti 243–254. [in Romanian]

Tatole V (1990) La structure de chromosomes polyténiques des glades salivaires de *Propsilocerus danubialis* Botnariuc and Albu1956 (Diptera, Chironomidae). Revue Roumaine de Biologie, Série biologie animale 35(1): 31–33. [in French]

Tatole V (1993a) Validation of the subgenus *Odontocladius* Albu 1974, as a part of the genus *Bryophaenocladius* Thienemann 1934. Revue Roumaine de Biologie, Série biologie animale 38(2): 111–114.

Tatole V (1993b) Cercetări asupra genului *Bryophaenocladius* Thienemann în România. Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie animala 45(2): 75–81. [in Romanian]

Tatole V (1993c) Noi consideraţii asupra situaţiei critice a endemitului *Romanichthys valsanicola*. Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător 37(2): 125–129. [in Romanian]

Tatole V (1994) Impactul haldelor de steril asupra faunei reofile (nevertebrate) în bazinul Râul Mare (Masivul Retezat). Ocrotirea Naturii şi a Mediului Inconjurător 38(2): 115–123. [in Romanian]

Tatole V (1995) Particularităţi ale diversităţii faunistice (nevertebrate) în câţiva afluenţi ai Mureşului Superior. Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător 39(1–2): 65–70. [in Romanian]

Tatole V (1996) Caracterizarea faunei de nevertebrate acvatice a unor afluenţi ai Mureşului Superior, Ilva, Galaoaia, Bistra. Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător 40(1–2): 87–97. [in Romanian]

Tatole V (1999) Tendencies of the taxonomic dynamics of the aquatic invertebrate fauna from middle Olt River section. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research I: 77–90.

Tatole V (2000) Checklist of Chironomidae (Diptera) of the Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 42: 117–132.

Tatole V (2002) Taxonomical Dynamics of the aquatic Invertebrate Fauna from Hydropower Harnessed R Olt. Limnology Report IAD (34): 367–381.

Tatole V (2003a) Consideration on the aquatic invertebrate fauna from the Piatra Craiului Natural Park. Research of Natural Park Piatra Craiului. Edit Phoenix. Brasov 217–231.

Tatole V (2003b) Insecta Diptera: Fam Chironomidae–Subfam. Orthocladiinae. Fauna României 11(15): 1–172. [in Romanian]

Tatole V (2004a) The 10 th Year of Monitoring Using Aquatic Invertebrates of the Ecological Impact of the Hydropower Harnessing Raul Mare-Retezat. 35th IAD Conference 19–23 April. Novi Sad: 367–381.

Tatole V (2004b) Consideration on aquatic invertebrate fauna from the Piatra Craiului National Park. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 45: 479–497.

Tatole V (2004c) Comparation of the taxonomical structure of the chironomid fauna from six Carpathian massifs of southern Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 46: 211–226.

Tatole V (2005) Characterization of the taxonomic dynamics of benthic fauna from the Romanian sector of the Danube, between 767–398 km. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 49: 481–499.

Tatole V (2007) Taxonomic structure of invertebrate fauna as a parametter for some aquatic ecosystems from Piatra Craiului National Park monitoring, Oltenia. Studii şi Comunicări/ Ştiinţele Naturii Craiova 23: 221–227.

Tatole V (2009) The chironomidae diversity in lenthic and lothic ecosystems from North Dobrodja, Romania. Oltenia. Studii şi Comunicări/Ştiinţele Naturii Craiova 25: 153–161.

Tatole V, Prunescu-Arion E (1992) Componenţa faunei unor afluenţi ai râului Olt din sectorul Fagaraş-Avrig. Hydrobiologia (20): 135–139. [in Romanian]

Tatole V, Sterghiu Cl, Cociu M (1994) Caracteristici ale diversităţii faunistice în zona Dăbuleni-Bechet (jud. Dolj). Ocrotirea Naturii şi a Mediului Inconjurător 38(1): 65–72. [in Romanian]

Tatole V, Zinevici V, Nicolescu N, Iftime A (2003) Structural analysis of the biotic component of hydropower harnessed ecosystems from the basins of Olt and Siret Rivers (Romania) Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 45: 499–526.

Tóth M, Magyari E, Buczkó K, Braun M, Panagiotopaulos K, Heiri O (2015) Chironomid-inferred Holocen temperature changes in the South Carpathians (Romania). The Holocene 25(4) 569–582. (hol.sagepub.com)

Tóth M, Buczkó K, Specziár A, Heiri O, Braun M, Hubay K, Czakó D, Magyari E (2017) Limnological changes in South Carpathian glacier-formed lakes (Retezat Mountains, Romania) during the Late Glacial and the Holocene: A synthesis. Environmental Science. Geoghaphy Quaternary International DOI: 10.1016/J.QUAINT.2017.05.023 Corpus ID: 135079631

Tóth M, Heiri O, Vincze I, Braun M, Szabó Z, Magyari E (2021) Limnological changes and chironomid-inferred summer air temperature from the Late Pleniglacial to the Early Holocene in the East Carpathians. Environmental Science. Geoghaphy Quaternary International. DOI: 10.1017/qua.2021.36 Corpus ID: 242457344

Truţă A-M, Anghel A G, Răcăreanu-Rădulescu-Florescu D A (2017) Research on the environmental quality in Bratia R. Current Trends in Natural Sciences, 6(12): 291–301. (on-line).

Tudorancea M-M, Tudorancea Cl (1998) On the communities structure of larval Chironomidae (Diptera) in the Rivers Crisul Repede and Somesul Mic (Romania). Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 40: 475–495.

Tudorancea M-M (1999) Contribuţii la studiul chironomidelordin doua râuri transilvănene. Annals of West University of Timisoara, Series of Biology II: 215–235. [in Romanian)

Tudorancea M-M, Tudorancea Cl (2000–2001) The Chironomidae Assemblages in Someşul Mic River (Romania) during 1996 and 1997. Annals of West University of Timisoara, Series of Biology III–IV: 103–114.

Wiederholm T (1983) Chironomidae of the Holarctic Region. Keis and Diagnoses. Part 1: Larvae. Entomologica scandinavica /Suppl (19): 1–457.

*** Chironomidae Collection from "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (CHR coll. MGAB).